

477	化粧品(洗顔料)	消費者から眼の諸症状(膜がかかったようになる、痛み、かすみ、赤み、刺激及び目やに)についての訴えがあった。
478	化粧品(メイク落とし)	使用後、眼痛のため開眼困難となり眼科を受診した。
479	コウジ酸	in vitro遺伝毒性とin vivo遺伝毒性について。
480	コウジ酸	ショウジョウバエ変異原性試験と肝RDS試験について。
481	コウジ酸	単回強制経口投与(マウス、ラット)試験、肝小核試験(マウス)等について。
482	コウジ酸	遺伝毒性と塗布使用によるヒト健康へのリスク評価について。
483	乾燥弱毒生麻しんワクチン、乾燥弱毒生風疹ワクチン、乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン、コレラワクチン、沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド、沈降破傷風トキソイド、沈降精製百日咳ジフテリア破傷風混合ワクチン、乾燥弱毒生麻しんおたふくかぜ風しん混合ワクチン、百日咳ジフテリア破傷風混合ワクチン、ジフテリアトキソイド、ジフテリア破傷風混合トキソイド、乾燥破傷風抗毒素、沈降精製百日咳ワクチン、百日咳ワクチン、乾燥痘そうワクチン、痘そうワクチン、ワイル病治療血清、日本脳炎ワクチン	北海道の5カ所の牧場で335の牛血清サンプルを用いウシ白血病ウイルスとウシ免疫不全ウイルスの垂直下感染について調査した。
484	乾燥弱毒生麻しんワクチン、乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン、乾燥弱毒生麻しんおたふくかぜ風しん混合ワクチン、インフルエンザHAワクチン、インフルエンザワクチン	WHOは全ての国々にインフルエンザ流行の際は各国の世界規模流行計画委員会を設置するよう勧告している。
485	乾燥弱毒生麻しんおたふくかぜ風しん混合ワクチン	2003年前半に日本で輸血を受けた男性がHIVに感染したとの発表があった。
486	塩酸バンコマイシン	バンコマイシン点滴静注用の使用医療機関において、VREの発現に関する情報を入手した。
487	インフルエンザHAワクチン	血液抗凝固剤服用患者においてインフルエンザワクチン接種後に循環虚脱、顆粒球・好中球減少症、腎不全を発症した。
488	はしか生ワクチン、乾燥弱毒生風しんワクチン、おたふくかぜ生ワクチン	1998年7月から台湾の各養豚場におけるインフルエンザ流行調査を行った。
489	ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン	血漿分画製剤の製造工程におけるTSEクリアランス試験の方法について「Points to consider」の基礎を作ること。
490	塩酸シプロフロキサシン	2002年のイングランド及びウェールズにおけるNeisseria gonorrhoeaeのciprofloxacin耐性:26施設における調査について。
491	ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン	英国保健省によるvCJDに関連する輸血事例についての英国議会での声明。
492	ヘパリンナトリウム	ワシントン州で牛海綿状脳症(BSE)に感染した牛1頭を確認した。
493	はしか生ワクチン、おたふくかぜ生ワクチン、インフルエンザHAワクチン、インフルエンザワクチン	高原病性トリインフルエンザH5N1の流行について。
494	乾燥弱毒生風疹ワクチン、乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン、コレラワクチン、沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド、沈降破傷風トキソイド、沈降精製百日咳ジフテリア破傷風混合ワクチン、百日咳ジフテリア破傷風混合ワクチン、ジフテリアトキソイド、ジフテリア破傷風混合トキソイド、沈降精製百日咳ワクチン、百日咳ワクチン、乾燥痘そうワクチン、日本脳炎ワクチン、乾燥弱毒生麻しんワクチン	2003年12月28日米国ワシントン州でBSE感染牛が確認され、英国の研究所にて検体の病理学的検査を行ったところBSE陽性であると確定した。
495	乾燥スルホ化人免疫グロブリン	霊長類における静注あるいは経口感染後の牛海綿状脳症病原体の組織分布について。
496	ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン	ウシ海綿状脳症(BSE)原因物質の霊長類への伝播の可能性を静脈経路によって評価し経口経路での感染と比較してその組織分布を調べた。

497	ナサルブラーゼ	CPMP及びCVMPによるヒト用医薬品及び動物用医薬品を介するTSEリスクを最小限にするためのガイドラインの第2改訂に関して。
-----	---------	---