

魚介類等による水銀の摂取量(試算)(昨年の審議会で用いた耐容量との比較)

メチル水銀濃度を基に試算

(魚介類等)

魚介類等	メチル水銀濃度(平均)	20歳以上の女性の摂食量(平均)	メチル水銀の摂取量(試算)	摂取頻度ごとの水銀摂取量(試算) μg/day										
	μg/g	g/day	μg/人/day	毎日	6回/週	5回/週	4回/週	3回/週	2回/週	1回/週	1回/2週	1回/3週	1回/4週	
エッチウバイカイ	0.49	40.0*7	19.40	19.40	16.63	13.86	11.09	8.31	5.54	2.77	1.39	0.92	0.69	
キダイ	0.34	58.3*9	19.76	19.76	16.94	14.12	11.29	8.47	5.65	2.82	1.41	0.94	0.71	
キンメダイ	0.52	76.5*8	39.70	39.70	34.03	28.36	22.69	17.02	11.34	5.67	2.84	1.89	1.42	
クロムツ	0.31	93.7*5	28.95	28.95	24.82	20.68	16.54	12.41	8.27	4.14	2.07	1.38	1.03	
ユメカサゴ	0.36*10	83.4*6	30.27	30.27	25.95	21.62	17.30	12.97	8.65	4.32	2.16	1.44	1.08	

(カジキ)

魚介類等	メチル水銀濃度(平均)	20歳以上の女性の摂食量(平均)	メチル水銀の摂取量(試算)	摂取頻度ごとの水銀摂取量(試算) μg/day										
	μg/g	g/day	μg/人/day	毎日	6回/週	5回/週	4回/週	3回/週	2回/週	1回/週	1回/2週	1回/3週	1回/4週	
マカジキ	0.34	73.0*2	25.04	25.04	21.46	17.89	14.31	10.73	7.15	3.58	1.79	1.19	0.89	
メカジキ	0.67	73.0*2	49.20	49.20	42.17	35.14	28.12	21.09	14.06	7.03	3.51	2.34	1.76	

(クジラ)

魚介類等	メチル水銀濃度(平均)	20歳以上の女性の摂食量(平均)	メチル水銀の摂取量(試算)	摂取頻度ごとの水銀摂取量(試算) μg/day										
	μg/g	g/day	μg/人/day	毎日	6回/週	5回/週	4回/週	3回/週	2回/週	1回/週	1回/2週	1回/3週	1回/4週	
イシイルカ	0.37	96.4*3	35.67	35.67	30.57	25.48	20.38	15.29	10.19	5.10	2.55	1.70	1.27	
コビレゴンドウ	1.49	96.4*3	143.44	143.44	122.95	102.46	81.97	61.48	40.98	20.49	10.25	6.83	5.12	
ツチクジラ	0.70	96.4*3	67.29	67.29	57.67	48.06	38.45	28.84	19.22	9.61	4.81	3.20	2.40	
バンドウイルカ	6.62	96.4*3	638.36	638.36	547.17	455.97	364.78	273.58	182.39	91.19	45.60	30.40	22.80	
マッコウクジラ	0.70	96.4*3	67.48	67.48	57.84	48.20	38.56	28.92	19.28	9.64	4.82	3.21	2.41	

- *1:サメの摂食量
- *2:カジキ摂食量
- *3:クジラの摂食量
- *4:マグロの摂食量
- *5:ムツの摂食量
- *6:魚類の平均摂食量

- *7:バイカイの摂食量
- *8:キンメダイの摂食量
- *9:タイの摂食量
- *10:総水銀の値
- *11:マグロ刺身、鉄火井等の1回分(いわゆる1人前)の量

- : 仮定1(他の魚介類からの水銀摂取はなし)において耐容量を超える場合(赤)
- : 仮定2(他の魚介類からの水銀摂取量を一日摂取量調査における魚介類からの水銀摂取量の半量)において耐容量を超える場合(黄色)
- : 仮定3(他の魚介類からの水銀摂取を一日摂取量調査における魚介類からの摂取量)において耐容量を超える場合(青)

この試算は多くの仮定に基づくものです。正確なご理解をお願いするとともに、報道等に当たっては、風評被害が生じることのないよう御配慮方お願いします。

(サメ)

魚介類等	メチル水銀濃度(平均)	20歳以上の女性の摂食量(平均)	メチル水銀の摂取量(試算)	摂取頻度ごとの水銀摂取量(試算) $\mu\text{g}/\text{day}$									
	$\mu\text{g}/\text{g}$	g/day	$\mu\text{g}/\text{人}/\text{day}$	毎日	6回/週	5回/週	4回/週	3回/週	2回/週	1回/週	1回/2週	1回/3週	1回/4週
ヨシキリザメ	0.35	82.5*1	28.88	28.88	24.75	20.63	16.50	12.38	8.25	4.13	2.06	1.38	1.03

(マグロ)

魚介類等	メチル水銀濃度(平均)	20歳以上の女性の摂食量(平均)	メチル水銀の摂取量(試算)	摂取頻度ごとの水銀摂取量(試算) $\mu\text{g}/\text{day}$									
	$\mu\text{g}/\text{g}$	g/day	$\mu\text{g}/\text{人}/\text{day}$	毎日	6回/週	5回/週	4回/週	3回/週	2回/週	1回/週	1回/2週	1回/3週	1回/4週
クロマグロ	0.55	35.7*4	19.49	19.49	16.71	13.92	11.14	8.35	5.57	2.78	1.39	0.93	0.70
ミナミマグロ	0.38	35.7*4	13.60	13.60	11.66	9.72	7.77	5.83	3.89	1.94	0.97	0.65	0.49
メバチ	0.55	35.7*4	19.74	19.74	16.92	14.10	11.28	8.46	5.64	2.82	1.41	0.94	0.71

(参考1:その他のマグロ類)

魚介類等	メチル水銀濃度(平均)	20歳以上の女性の摂食量(平均)	メチル水銀の摂取量(試算)	摂取頻度ごとの水銀摂取量(試算) $\mu\text{g}/\text{day}$									
	$\mu\text{g}/\text{g}$	g/day	$\mu\text{g}/\text{人}/\text{day}$	毎日	6回/週	5回/週	4回/週	3回/週	2回/週	1回/週	1回/2週	1回/3週	1回/4週
キハダ	0.18	35.7*4	6.35	6.35	5.45	4.54	3.63	2.72	1.82	0.91	0.45	0.30	0.23
ビンナガ	0.16	35.7*4	5.85	5.85	5.02	4.18	3.35	2.51	1.67	0.84	0.42	0.28	0.21
メジマグロ(幼魚)	0.19	35.7*4	6.60	6.60	5.66	4.72	3.77	2.83	1.89	0.94	0.47	0.31	0.24
ツナ缶詰	0.11*10	35.7*4	3.89	3.89	3.34	2.78	2.22	1.67	1.11	0.56	0.28	0.19	0.14

(参考2:1人前の調査からマグロの摂食量を1日80gとした場合)

魚介類等	メチル水銀濃度(平均)	20歳以上の女性の摂食量(平均)	メチル水銀の摂取量(試算)	摂取頻度ごとのメチル水銀摂取量(試算) $\mu\text{g}/\text{day}$									
	$\mu\text{g}/\text{g}$	g/day	$\mu\text{g}/\text{人}/\text{day}$	毎日	6回/週	5回/週	4回/週	3回/週	2回/週	1回/週	1回/2週	1回/3週	1回/4週
クロマグロ	0.55	80.0*11	43.68	43.68	37.44	31.20	24.96	18.72	12.48	6.24	3.12	2.08	1.56
ミナミマグロ	0.38	80.0*11	30.48	30.48	26.13	21.77	17.42	13.06	8.71	4.35	2.18	1.45	1.09
メバチ	0.55	80.0*11	44.24	44.24	37.92	31.60	25.28	18.96	12.64	6.32	3.16	2.11	1.58

(事務局注)

マグロの名称については、キハダはキハダマグロ、ビンナガはビンナガマグロ(またはビンチョウ)、ミナミマグロはインドマグロ、メバチはメバチマグロ(またはバチマグロ)、クロマグロは本マグロと同義である。

この試算は多くの仮定に基づくものです。正確なご理解をお願いするとともに、報道等に当たっては、風評被害が生じることのないよう御配慮方お願いします。

魚介類等による水銀の摂取量(試算)(昨年の審議会で用いた耐容量との比較)

総水銀濃度を基に試算

(魚介類等)

魚介類等	総水銀濃度(平均)	20歳以上の女性の摂食量(平均)	メチル水銀の摂取量(試算)	摂取頻度ごとの水銀摂取量(試算) μg/day										
	μg/g	g/day	μg/人/day	毎日	6回/週	5回/週	4回/週	3回/週	2回/週	1回/週	1回/2週	1回/3週	1回/4週	
エッチュウバイカイ	0.51	40.0*7	20.28	20.28	17.38	14.49	11.59	8.69	5.79	2.90	1.45	0.97	0.72	
キダイ	0.34	58.3*9	19.76	19.76	16.94	14.12	11.29	8.47	5.65	2.82	1.41	0.94	0.71	
キンメダイ	0.67	76.5*8	50.87	50.87	43.61	36.34	29.07	21.80	14.54	7.27	3.63	2.42	1.82	
クロムツ	0.36	93.7*5	33.45	33.45	28.67	23.89	19.11	14.34	9.56	4.78	2.39	1.59	1.19	
ユメカサゴ	0.44	73.4*6	32.30	32.30	27.68	23.07	18.45	13.84	9.23	4.61	2.31	1.54	1.15	

(カジキ)

魚介類等	総水銀濃度(平均)	20歳以上の女性の摂食量(平均)	メチル水銀の摂取量(試算)	摂取頻度ごとの水銀摂取量(試算) μg/day										
	μg/g	g/day	μg/人/day	毎日	6回/週	5回/週	4回/週	3回/週	2回/週	1回/週	1回/2週	1回/3週	1回/4週	
マカジキ	0.52	73.0*2	37.89	37.89	32.47	27.06	21.65	16.24	10.82	5.41	2.71	1.80	1.35	
メカジキ	0.94	73.0*2	68.84	68.84	59.00	49.17	39.34	29.50	19.67	9.83	4.92	3.28	2.46	

(クジラ)

魚介類等	総水銀濃度(平均)	20歳以上の女性の摂食量(平均)	メチル水銀の摂取量(試算)	摂取頻度ごとの水銀摂取量(試算) μg/day										
	μg/g	g/day	μg/人/day	毎日	6回/週	5回/週	4回/週	3回/週	2回/週	1回/週	1回/2週	1回/3週	1回/4週	
イシイルカ	1.04	96.4*3	99.77	99.77	85.52	71.27	57.01	42.76	28.51	14.25	7.13	4.75	3.56	
コビレゴンドウ	7.10	96.4*3	684.44	684.44	586.66	488.89	391.11	293.33	195.55	97.78	48.89	32.59	24.44	
ツチクジラ	1.17	96.4*3	112.60	112.60	96.51	80.43	64.34	48.26	32.17	16.09	8.04	5.36	4.02	
バンドウイルカ	20.84	96.4*3	2,008.98	2,008.98	1,721.98	1,434.98	1,147.99	860.99	573.99	287.00	143.50	95.67	71.75	
マッコウクジラ	2.10	96.4*3	202.44	202.44	173.52	144.60	115.68	86.76	57.84	28.92	14.46	9.64	7.23	

- *1:サメの摂食量
- *2:カジキ摂食量
- *3:クジラの摂食量
- *4:マグロの摂食量
- *5:ムツの摂食量
- *6:魚類の平均摂食量
- *7:バイカイの摂食量
- *8:キンメダイの摂食量
- *9:タイの摂食量
- *10:総水銀の値
- *11:マグロ刺身、鉄火丼等の1回分(いわゆる1人前)の量

- :仮定1(他の魚介類からの水銀摂取はなし)において耐容量を超える場合
- ▨:仮定2(他の魚介類からの水銀摂取量を一日摂取量調査における魚介類からの水銀摂取量の半量)において耐容量を超える場合
- :仮定3(他の魚介類からの水銀摂取を一日摂取量調査における魚介類からの摂取量)において耐容量を超える場合

この試算は多くの仮定に基づくものです。正確なご理解をお願いするとともに、報道等に当たっては、風評被害が生じることをないよう御配慮方お願いします。

(サメ)

魚介類等	総水銀濃度 (平均)	20歳以上の 女性の摂食 量(平均)	メチル水銀の 摂取量(試算)	摂取頻度ごとの水銀摂取量(試算) $\mu\text{g/day}$											
	$\mu\text{g/g}$	g/day	$\mu\text{g/人/day}$	毎日	6回/週	5回/週	4回/週	3回/週	2回/週	1回/週	1回/2週	1回/3週	1回/4週		
ヨシキリザメ	0.54	82.5 *1	44.88	44.88	38.47	32.06	25.65	19.23	12.82	6.41	3.21	2.14	1.60		

(マグロ)

魚介類等	総水銀濃度 (平均)	20歳以上の 女性の摂食 量(平均)	メチル水銀の 摂取量(試算)	摂取頻度ごとの水銀摂取量(試算) $\mu\text{g/day}$											
	$\mu\text{g/g}$	g/day	$\mu\text{g/人/day}$	毎日	6回/週	5回/週	4回/週	3回/週	2回/週	1回/週	1回/2週	1回/3週	1回/4週		
クロマグロ	0.73	35.7 *4	26.03	26.03	22.31	18.59	14.87	11.15	7.44	3.72	1.86	1.24	0.93		
ミナミマグロ	0.49	35.7 *4	17.42	17.42	14.93	12.44	9.96	7.47	4.98	2.49	1.24	0.83	0.62		
メバチ	0.74	35.7 *4	26.49	26.49	22.71	18.92	15.14	11.35	7.57	3.78	1.89	1.26	0.95		

(参考1:その他のマグロ類)

魚介類等	総水銀濃度 (平均)	20歳以上の 女性の摂食 量(平均)	メチル水銀の 摂取量(試算)	摂取頻度ごとの水銀摂取量(試算) $\mu\text{g/day}$											
	$\mu\text{g/g}$	g/day	$\mu\text{g/人/day}$	毎日	6回/週	5回/週	4回/週	3回/週	2回/週	1回/週	1回/2週	1回/3週	1回/4週		
キハダ	0.21	35.7 *4	7.57	7.57	6.49	5.41	4.32	3.24	2.16	1.08	0.54	0.36	0.27		
ビンナガ	0.24	35.7 *4	8.60	8.60	7.37	6.15	4.92	3.69	2.46	1.23	0.61	0.41	0.31		
メジマグロ(幼魚)	0.19	35.7 *4	6.85	6.85	5.88	4.90	3.92	2.94	1.96	0.98	0.49	0.33	0.24		
ツナ缶詰	0.11	28.8 *4	3.28	3.28	2.81	2.35	1.88	1.41	0.94	0.47	0.23	0.16	0.12		

(参考2:1人前の調査からマグロの摂食量を1日80gとした場合)

魚介類等	総水銀濃度 (平均)	20歳以上の 女性の摂食 量(平均)	メチル水銀の 摂取量(試算)	摂取頻度ごとの水銀摂取量(試算) $\mu\text{g/day}$											
	$\mu\text{g/g}$	g/day	$\mu\text{g/人/day}$	毎日	6回/週	5回/週	4回/週	3回/週	2回/週	1回/週	1回/2週	1回/3週	1回/4週		
クロマグロ	0.73	80.0 *11	58.32	58.32	49.99	41.66	33.33	24.99	16.66	8.33	4.17	2.78	2.08		
ミナミマグロ	0.49	80.0 *11	39.04	39.04	33.46	27.89	22.31	16.73	11.15	5.58	2.79	1.86	1.39		
メバチ	0.74	80.0 *11	59.36	59.36	50.88	42.40	33.92	25.44	16.96	8.48	4.24	2.83	2.12		

(事務局注)

マグロの名称については、キハダはキハダマグロ、ビンナガはビンナガマグロ(またはビンチョウ)、ミナミマグロはインドマグロ、メバチはメバチマグロ(またはバチマグロ)、クロマグロは本マグロと同義である。

この試算は多くの仮定に基づくものです。正確なご理解をお願いするとともに、報道等に当たっては、風評被害が生じることのないよう御配慮方お願いします。