

平成18年度「慢性期入院医療の包括評価に関する調査」 《患者特性調査(介護療養病棟) 集計結果(全病院比較)》

平成18年度調査集計対象:平成18年度調査対象病院(全35病院)の療養型介護療養施設サービス費を算定している患者
平成17年度調査集計対象:平成17年度慢性期入院医療実態調査の対象病院(全186病院)の療養型介護療養施設サービス費を算定している患者

(注)本集計における「医療区分」は、特殊疾患療養病棟等の経過措置については考慮していない。

1 ADL区分・医療区分、認知機能障害加算の状況

ADL区分	平成18年度調査				平成17年度調査			
	医療区分1 (n=1,489)	医療区分2 (n=1,002)	医療区分3 (n=178)	合計 (n=2,669)	医療区分1 (n=4,407)	医療区分2 (n=2,724)	医療区分3 (n=475)	合計 (n=7,606)
ADL区分3	20.9%	20.7%	5.2%	46.9%	25.8%	22.2%	5.2%	53.1%
ADL区分2	22.4%	12.6%	1.2%	36.2%	23.0%	10.4%	0.8%	34.3%
ADL区分1	5.6%(認)	2.1%(認)	0.3%	16.9%	4.1%(認)	1.6%(認)	0.2%	12.6%
	6.8%	2.1%			5.0%	1.6%		
全体	55.8%	37.5%	6.7%	100.0%	57.9%	35.8%	6.2%	100.0%
無回答(n)	(2)	(0)	(0)	(2)	(29)	(12)	(2)	(43)

2 医療区分採用項目

医療区分採用項目	平成18年度調査				平成17年度調査			
	医療区分1 (n=1,491)	医療区分2 (n=1,002)	医療区分3 (n=178)	合計 (n=2,671)	医療区分1 (n=4,436)	医療区分2 (n=2,736)	医療区分3 (n=477)	合計 (n=7,649)
スモン	0.0%	0.0%	1.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
24時間の監視・管理	0.0%	0.0%	5.6%	0.4%	0.0%	0.0%	11.7%	0.7%
中心静脈栄養	0.0%	0.0%	19.1%	1.3%	0.0%	0.0%	16.8%	1.0%
24時間持続点滴	0.0%	0.0%	62.4%	4.2%	0.0%	0.0%	37.1%	2.3%
人工呼吸器(レスピレーター)	0.0%	0.0%	1.7%	0.1%	0.0%	0.0%	0.6%	0.0%
ドレーン法・胸腹腔洗浄	0.0%	0.0%	0.6%	0.0%	0.0%	0.0%	4.8%	0.3%
気管切開・気管内挿管[×発熱]	0.0%	0.0%	9.0%	0.6%	0.0%	0.0%	7.8%	0.5%
酸素療法	0.0%	0.0%	32.6%	2.2%	0.0%	0.0%	47.6%	3.0%
感染隔離室におけるケア	0.0%	0.0%	9.6%	0.6%	0.0%	0.0%	11.3%	0.7%
多発性硬化症	0.0%	0.7%	0.0%	0.3%	0.0%	0.7%	0.2%	0.3%
パーキンソン病関連疾患	0.0%	14.3%	5.1%	5.7%	0.0%	13.9%	6.7%	5.4%
その他神経難病	0.0%	1.2%	2.2%	0.6%	0.0%	1.3%	0.4%	0.5%
神経難病以外の難病	0.0%	0.7%	0.0%	0.3%	0.0%	1.3%	0.4%	0.5%
脊髄損傷[×四肢麻痺]	0.0%	1.3%	0.0%	0.5%	0.0%	0.3%	0.0%	0.1%
肺気腫/慢性閉塞性肺疾患(COPD)	0.0%	5.8%	8.4%	2.7%	0.0%	3.7%	7.8%	1.8%
悪性腫瘍[×疼痛コントロール]	0.0%	0.5%	0.6%	0.2%	0.0%	0.3%	0.4%	0.1%
肺炎	0.0%	7.0%	28.1%	4.5%	0.0%	10.8%	24.7%	5.4%
尿路感染症	0.0%	7.1%	7.3%	3.1%	0.0%	6.7%	8.6%	2.9%
創感染	0.0%	0.4%	1.1%	0.2%	0.0%	1.3%	1.5%	0.5%
リハビリテーション	0.0%	1.0%	0.0%	0.4%	0.0%	2.2%	1.5%	0.9%
脱水	0.0%	7.7%	15.2%	3.9%	0.0%	3.9%	7.1%	1.8%
体内出血	0.0%	0.9%	0.6%	0.4%	0.0%	0.8%	4.6%	0.6%
嘔吐	0.0%	1.1%	4.5%	0.7%	0.0%	2.4%	6.7%	1.3%
*褥瘡	0.0%	4.6%	12.4%	2.5% ↓	0.0%	15.8%	16.8%	6.7%
うつ血性潰瘍	0.0%	1.4%	1.1%	0.6%	0.0%	1.1%	1.0%	0.5%
せん妄の兆候	0.0%	4.2%	3.9%	1.8%	0.0%	3.5%	2.5%	1.4%
*うつ状態	0.0%	18.0%	7.9%	7.3%	0.0%	14.5%	3.4%	5.4%
暴行	0.0%	5.1%	2.8%	2.1%	0.0%	4.9%	1.5%	1.8%
透析	0.0%	0.5%	0.0%	0.2%	0.0%	0.4%	0.0%	0.1%
経鼻胃管・胃瘦の経腸栄養 [×発熱または嘔吐]	0.0%	6.2%	21.9%	3.8%	0.0%	8.9%	20.8%	4.5%
喀痰吸引(1日8回以上)	0.0%	19.3%	41.6%	10.0%	0.0%	19.7%	40.3%	9.6%
気管切開・気管内挿管	0.0%	4.8%	13.5%	2.7%	0.0%	5.9%	14.9%	3.0%
血糖検査(1日3回以上)	0.0%	3.6%	1.7%	1.5%	0.0%	2.0%	1.9%	0.8%
皮膚の潰瘍のケア	0.0%	7.8%	11.2%	3.7%	0.0%	9.4%	9.4%	3.9%
創傷処置	0.0%	19.1%	12.4%	8.0%	0.0%	18.1%	10.7%	7.1%
全 体	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

(注) ↑は平成17年度と比較して3%以上増加がみられたもの、↓は3%以上減少がみられたもの
左端に*のついた項目は、共通病院での比較と傾向の違いが見られたもの(矢印の向き又は矢印の有無)

3 入退院の状況

調査病棟に入院する前の状況	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=1,491)		医療区分2 (n=1,002)		医療区分3 (n=178)		合計 (n=2,671)	
1. 自宅(家族等との同居も含む)	189	12.7%	110	11.0%	12	6.7%	311	11.6%
2. グループホーム	10	0.7%	2	0.2%	0	0.0%	12	0.4%
3. 有料老人ホーム	13	0.9%	6	0.6%	3	1.7%	22	0.8%
4. ケアハウス(軽費老人ホーム含む)	3	0.2%	6	0.6%	0	0.0%	9	0.3%
5. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)	13	0.9%	13	1.3%	3	1.7%	29	1.1%
6. 介護老人保健施設	59	4.0%	38	3.8%	5	2.8%	102	3.8%
* 7. 他の医療機関	557	37.4%	458	45.7%	71	39.9%	1,086	40.7% ↑
(再掲)他の医療機関の一般病床	471	31.6%	382	38.1%	61	34.3%	914	34.2%
(再掲)他の医療機関の療養病床	57	3.8%	63	6.3%	9	5.1%	129	4.8%
(再掲)他の医療機関のその他の病床(精神病床等)	29	1.9%	13	1.3%	1	0.6%	43	1.6%
* 8. 自院の他の病床	644	43.2%	369	36.8%	82	46.1%	1,095	41.0% ↓
(再掲)自院の一般病床(転棟)	274	18.4%	178	17.8%	52	29.2%	504	18.9%
(再掲)自院のその他の病床(精神病床等)(転)	370	24.8%	191	19.1%	30	16.9%	591	22.1%
* 9. わからない	2	0.1%	0	0.0%	2	1.1%	4	0.1% ↓
無回答	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.0%
全体	1,491	100.0%	1,002	100.0%	178	100.0%	2,671	100.0%

(注)平成18年度集計表の、↑は平成17年度と比較して3%以上増加がみられたもの、↓は3%以上減少がみられたもの
左端に*のついた項目は、共通病院での比較と傾向の違いが見られたもの(矢印の向き又は矢印の有無)

調査病棟に入院する前の状況	平成17年度調査							
	医療区分1 (n=4,436)		医療区分2 (n=2,736)		医療区分3 (n=477)		合計 (n=7,649)	
1. 自宅(家族等との同居も含む)	473	10.7%	268	9.8%	51	10.7%	792	10.4%
2. グループホーム	4	0.1%	7	0.3%	0	0.0%	11	0.1%
3. 有料老人ホーム	13	0.3%	9	0.3%	1	0.2%	23	0.3%
4. ケアハウス(軽費老人ホーム含む)	7	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	7	0.1%
5. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)	71	1.6%	58	2.1%	18	3.8%	147	1.9%
6. 介護老人保健施設	177	4.0%	106	3.9%	19	4.0%	302	3.9%
7. 他の医療機関	1,399	31.5%	837	30.6%	151	31.7%	2,387	31.2%
8. 自院の他の病床	2,117	47.7%	1,350	49.3%	220	46.1%	3,687	48.2%
9. わからない	175	3.9%	101	3.7%	17	3.6%	293	3.8%
全体	4,436	100.0%	2,736	100.0%	477	100.0%	7,649	100.0%

調査病棟に入院した背景(複数回答)	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=1,491)		医療区分2 (n=1,002)		医療区分3 (n=178)		合計 (n=2,671)	
急性期状態が安定	918	61.6%	696	69.5%	122	68.5%	1,736	65.0% ↑
疾病の急性増悪	72	4.8%	56	5.6%	11	6.2%	139	5.2%
継続的高度医療管理が必要	72	4.8%	112	11.2%	36	20.2%	220	8.2%
* 継続的なりハビリが必要	606	40.6%	380	37.9%	59	33.1%	1,045	39.1% ↑
* 他施設の空きがない	198	13.3%	96	9.6%	5	2.8%	299	11.2% ↓
自宅の体制が整わない	415	27.8%	227	22.7%	29	16.3%	671	25.1% ↑
本人、家族等が希望	1,210	81.2%	824	82.2%	144	80.9%	2,178	81.5% ↑
全体	1,491	100.0%	1,002	100.0%	178	100.0%	2,671	100.0%

(注)平成18年度集計表の、↑は平成17年度と比較して3%以上増加がみられたもの、↓は3%以上減少がみられたもの
左端に*のついた項目は、共通病院での比較と傾向の違いが見られたもの(矢印の向き又は矢印の有無)

調査病棟に入院した背景(複数回答)	平成17年度調査							
	医療区分1 (n=4,436)		医療区分2 (n=2,736)		医療区分3 (n=477)		合計 (n=7,649)	
急性期状態が安定	2,638	59.5%	1,708	62.4%	294	61.6%	4,640	60.7%
疾病の急性増悪	242	5.5%	165	6.0%	49	10.3%	456	6.0%
継続的高度医療管理が必要	230	5.2%	299	10.9%	111	23.3%	640	8.4%
継続的なりハビリが必要	1,544	34.8%	903	33.0%	119	24.9%	2,566	33.5%
他施設の空きがない	739	16.7%	386	14.1%	28	5.9%	1,153	15.1%
自宅の体制が整わない	1,052	23.7%	577	21.1%	51	10.7%	1,680	22.0%
本人、家族等が希望	2,800	63.1%	1,749	63.9%	281	58.9%	4,830	63.1%
全体	4,436	100.0%	2,736	100.0%	477	100.0%	7,649	100.0%

退院先の見通し (「退院(転院・転倒)の見込みは無い」と回答された患者を除く)	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=427)		医療区分2 (n=261)		医療区分3 (n=51)		合計 (n=739)	
1. 自宅(家族等との同居も含む)	60	14.1%	25	9.6%	7	13.7%	92	12.4% ↓
2. グループホーム	36	8.4%	8	3.1%	0	0.0%	44	6.0% ↑
3. 有料老人ホーム	11	2.6%	5	1.9%	2	3.9%	18	2.4%
* 4. ケアハウス(軽費老人ホーム含む)	15	3.5%	1	0.4%	2	3.9%	18	2.4%
* 5. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)	173	40.5%	78	29.9%	3	5.9%	254	34.4% ↓
6. 介護老人保健施設	73	17.1%	71	27.2%	5	9.8%	149	20.2%
* 7. 他の医療機関	48	11.2%	52	19.9%	21	41.2%	121	16.4% ↑
(再掲)他の医療機関の一般病床	2	0.5%	5	1.9%	0	0.0%	7	0.9%
(再掲)他の医療機関の療養病床	44	10.3%	42	16.1%	21	41.2%	107	14.5%
(再掲)他の医療機関のその他の病床	2	0.5%	5	1.9%	0	0.0%	7	0.9%
8. 自院の他の病床	5	1.2%	16	6.1%	7	13.7%	28	3.8% ↓
(再掲)自院の障害者施設等入院基本料算定病	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
(再掲)自院の一般病床(10.の病棟を除く)	4	0.9%	10	3.8%	4	7.8%	18	2.4%
(再掲)自院のその他の病床	1	0.2%	6	2.3%	3	5.9%	10	1.4%
9. その他	6	1.4%	5	1.9%	4	7.8%	15	2.0%
全体	427	100.0%	261	100.0%	51	100.0%	739	100.0%

(注)平成18年度集計表の、↑は平成17年度と比較して3%以上増加がみられたもの、↓は3%以上減少がみられたもの
左端に*のついた項目は、共通病院での比較と傾向の違いが見られたもの(矢印の向き又は矢印の有無)

退院先の見通し	平成17年度調査							
	医療区分1 (n=1,422)		医療区分2 (n=892)		医療区分3 (n=102)		合計 (n=2,416)	
1. 自宅(家族等との同居も含む)	237	16.7%	134	15.0%	10	9.8%	381	15.8%
2. グループホーム	21	1.5%	11	1.2%	0	0.0%	32	1.3%
3. 有料老人ホーム	9	0.6%	7	0.8%	0	0.0%	16	0.7%
4. ケアハウス	11	0.8%	3	0.3%	1	1.0%	15	0.6%
5. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)	690	48.5%	415	46.5%	40	39.2%	1,145	47.4%
6. 介護老人保健施設	266	18.7%	140	15.7%	19	18.6%	425	17.6%
7. 他の医療機関	105	7.4%	107	12.0%	15	14.7%	227	9.4%
8. 自院の他の病床	83	5.8%	75	8.4%	17	16.7%	175	7.2%
全体	1,422	100.0%	892	100.0%	102	100.0%	2,416	100.0%
(わからない)	3,014		1,844		375		5,233	

(注)上記集計表は、平成18年度と比較するため、「9. わからない」の回答者を除く患者数での、各選択肢の回答割合である

<平成18年度のみ> 退院の見通し	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=1,491)		医療区分2 (n=1,002)		医療区分3 (n=178)		合計 (n=2,671)	
90日以内に退院できる見通し	62	4.2%	38	3.8%	12	6.7%	112	4.2%
90日以内に退院できる見通しはないが、今後受け 血が整備されれば退院できる	353	23.7%	191	19.1%	19	10.7%	563	21.1%
悪化して転院・転棟・死亡する見通し	12	0.8%	32	3.2%	20	11.2%	64	2.4%
退院(転院・転棟)の見通しはない	1,063	71.3%	741	74.0%	127	71.3%	1,931	72.3%
無回答	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.0%
全体	1,491	100.0%	1,002	100.0%	178	100.0%	2,671	100.0%

＜平成18年度のみ＞ 退院先の見通し(「90日以内に退院できる見通し」の回答者)	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=62)		医療区分2 (n=38)		医療区分3 (n=12)		合計 (n=112)	
1. 自宅(家族等との同居も含む)	25	40.3%	10	26.3%	2	16.7%	37	33.0%
2. グループホーム	5	8.1%	1	2.6%	0	0.0%	6	5.4%
3. 有料老人ホーム	2	3.2%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.8%
4. ケアハウス(軽費老人ホーム含む)	2	3.2%	1	2.6%	0	0.0%	3	2.7%
5. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)	4	6.5%	5	13.2%	0	0.0%	9	8.0%
6. 介護老人保健施設	13	21.0%	7	18.4%	0	0.0%	20	17.9%
7. 他の医療機関の一般病床	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
8. 他の医療機関の療養病床	9	14.5%	13	34.2%	10	83.3%	32	28.6%
9. 他の医療機関のその他の病床	2	3.2%	1	2.6%	0	0.0%	3	2.7%
10. 自院の障害者施設等入院基本料算定病床	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
11. 自院の一般病床(10.の病棟を除く)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
12. 自院のその他の病床	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
13. その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
全体	62	100.0%	38	100.0%	12	100.0%	112	100.0%

＜平成18年度のみ＞ 退院先の見通し(「今後受け皿が整備されれば退院できる」の回答者)	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=353)		医療区分2 (n=191)		医療区分3 (n=19)		合計 (n=563)	
1. 自宅(家族等との同居も含む)	35	9.9%	13	6.8%	2	10.5%	50	8.9%
2. グループホーム	31	8.8%	7	3.7%	0	0.0%	38	6.7%
3. 有料老人ホーム	8	2.3%	4	2.1%	1	5.3%	13	2.3%
4. ケアハウス(軽費老人ホーム含む)	13	3.7%	0	0.0%	0	0.0%	13	2.3%
5. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)	168	47.6%	72	37.7%	2	10.5%	242	43.0%
6. 介護老人保健施設	60	17.0%	64	33.5%	5	26.3%	129	22.9%
7. 他の医療機関の一般病床	1	0.3%	1	0.5%	0	0.0%	2	0.4%
8. 他の医療機関の療養病床	35	9.9%	26	13.6%	9	47.4%	70	12.4%
9. 他の医療機関のその他の病床	0	0.0%	2	1.0%	0	0.0%	2	0.4%
10. 自院の障害者施設等入院基本料算定病床	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
11. 自院の一般病床(10.の病棟を除く)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
12. 自院のその他の病床	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.2%
13. その他	1	0.3%	2	1.0%	0	0.0%	3	0.5%
全体	353	100.0%	191	100.0%	19	100.0%	563	100.0%

＜平成18年度のみ＞ 退院先の見通し(「悪化して転院・転棟・死亡する見通し」の回答者)	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=12)		医療区分2 (n=32)		医療区分3 (n=20)		合計 (n=64)	
1. 自宅(家族等との同居も含む)	0	0.0%	2	6.3%	3	15.0%	5	7.8%
2. グループホーム	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
3. 有料老人ホーム	1	8.3%	1	3.1%	1	5.0%	3	4.7%
4. ケアハウス(軽費老人ホーム含む)	0	0.0%	0	0.0%	2	10.0%	2	3.1%
5. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)	1	8.3%	1	3.1%	1	5.0%	3	4.7%
6. 介護老人保健施設	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
7. 他の医療機関の一般病床	1	8.3%	4	12.5%	0	0.0%	5	7.8%
8. 他の医療機関の療養病床	0	0.0%	3	9.4%	2	10.0%	5	7.8%
9. 他の医療機関のその他の病床	0	0.0%	2	6.3%	0	0.0%	2	3.1%
10. 自院の障害者施設等入院基本料算定病床	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
11. 自院の一般病床(10.の病棟を除く)	4	33.3%	10	31.3%	4	20.0%	18	28.1%
12. 自院のその他の病床	0	0.0%	6	18.8%	3	15.0%	9	14.1%
13. その他	5	41.7%	3	9.4%	4	20.0%	12	18.8%
全体	12	100.0%	32	100.0%	20	100.0%	64	100.0%

4 その他の患者状態像（医療区分採用項目以外）

疾患(複数回答)	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=1,491)		医療区分2 (n=1,002)		医療区分3 (n=178)		合計 (n=2,671)	
糖尿病	169	11.3%	144	14.4%	23	12.9%	336	12.6%
* 不整脈	105	7.0%	62	6.2%	17	9.6%	184	6.9% ↑
* うっ血性心不全	101	6.8%	82	8.2%	27	15.2%	210	7.9%
高血圧症	409	27.4%	245	24.5%	27	15.2%	681	25.5% ↑
虚血性心疾患	106	7.1%	83	8.3%	18	10.1%	207	7.7%
* 大腿骨頸部骨折	213	14.3%	100	10.0%	13	7.3%	326	12.2% ↑
* 脊椎圧迫骨折	72	4.8%	61	6.1%	9	5.1%	142	5.3% ↑
その他の骨折	75	5.0%	37	3.7%	9	5.1%	121	4.5%
関節リウマチ	22	1.5%	17	1.7%	2	1.1%	41	1.5%
* アルツハイマー病	225	15.1%	125	12.5%	21	11.8%	371	13.9% ↑
失語症	146	9.8%	119	11.9%	34	19.1%	299	11.2% ↑
脳性麻痺	10	0.7%	5	0.5%	1	0.6%	16	0.6%
脳梗塞	727	48.8%	475	47.4%	75	42.1%	1,277	47.8%
脳出血	256	17.2%	163	16.3%	38	21.3%	457	17.1%
アルツハイマー病以外の認知症	529	35.5%	325	32.4%	54	30.3%	908	34.0% ↑
片側不全麻痺	352	23.6%	214	21.4%	40	22.5%	606	22.7% ↑
* 四肢麻痺	72	4.8%	88	8.8%	30	16.9%	190	7.1%
脊髄損傷	9	0.6%	17	1.7%	0	0.0%	26	1.0%
喘息	31	2.1%	24	2.4%	8	4.5%	63	2.4%
腎不全	49	3.3%	56	5.6%	6	3.4%	111	4.2%
がん(悪性腫瘍)	62	4.2%	68	6.8%	17	9.6%	147	5.5%
腸閉塞(イレウス)＜新規＞	12	0.8%	21	2.1%	4	2.2%	37	1.4%
肝不全＜新規＞	16	1.1%	9	0.9%	4	2.2%	29	1.1%
急性心不全＜新規＞	4	0.3%	6	0.6%	0	0.0%	10	0.4%
慢性心不全＜新規＞	134	9.0%	87	8.7%	27	15.2%	248	9.3%
仮性球麻痺＜新規＞	79	5.3%	93	9.3%	28	15.7%	200	7.5%
全体	1,491	100.0%	1,002	100.0%	178	100.0%	2,671	100.0%

(注)平成18年度集計表の、↑は平成17年度と比較して3%以上増加がみられたもの、↓は3%以上減少がみられたもの
左端に*のついた項目は、共通病院での比較と傾向の違いが見られたもの(矢印の向き又は矢印の有無)

疾患(複数回答)	平成17年度調査							
	医療区分1 (n=4,436)		医療区分2 (n=2,736)		医療区分3 (n=477)		合計 (n=7,649)	
糖尿病	538	12.1%	316	11.5%	50	10.5%	904	11.8%
不整脈	155	3.5%	92	3.4%	29	6.1%	276	3.6%
うっ血性心不全	307	6.9%	227	8.3%	74	15.5%	608	7.9%
高血圧症	963	21.7%	502	18.3%	98	20.5%	1,563	20.4%
虚血性心疾患	312	7.0%	184	6.7%	37	7.8%	533	7.0%
大腿骨頸部骨折	399	9.0%	213	7.8%	30	6.3%	642	8.4%
脊椎圧迫骨折	116	2.6%	49	1.8%	8	1.7%	173	2.3%
その他の骨折	145	3.3%	99	3.6%	6	1.3%	250	3.3%
関節リウマチ	86	1.9%	40	1.5%	11	2.3%	137	1.8%
アルツハイマー病	261	5.9%	171	6.3%	22	4.6%	454	5.9%
失語症	234	5.3%	161	5.9%	33	6.9%	428	5.6%
脳性麻痺	15	0.3%	7	0.3%	2	0.4%	24	0.3%
脳梗塞	2,168	48.9%	1,239	45.3%	239	50.1%	3,646	47.7%
脳出血	647	14.6%	384	14.0%	72	15.1%	1,103	14.4%
アルツハイマー病以外の認知症	1,094	24.7%	628	23.0%	86	18.0%	1,808	23.6%
片側不全麻痺	645	14.5%	309	11.3%	45	9.4%	999	13.1%
四肢麻痺	172	3.9%	144	5.3%	44	9.2%	360	4.7%
脊髄損傷	13	0.3%	21	0.8%	1	0.2%	35	0.5%
喘息	88	2.0%	68	2.5%	22	4.6%	178	2.3%
腎不全	86	1.9%	58	2.1%	22	4.6%	166	2.2%
がん(悪性腫瘍)	150	3.4%	117	4.3%	33	6.9%	300	3.9%
全体	4,436	100.0%	2,736	100.0%	477	100.0%	7,649	100.0%

感染症(複数回答)	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=1,491)		医療区分2 (n=1,002)		医療区分3 (n=178)		合計 (n=2,671)	
抗生物質耐性菌感染(たとえばMRSA)	6	0.4%	16	1.6%	19	10.7%	41	1.5%
後天性免疫不全症候群(HIV感染含む)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
上気道感染	4	0.3%	27	2.7%	6	3.4%	37	1.4%
敗血症	1	0.1%	1	0.1%	3	1.7%	5	0.2%
多剤耐性結核	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
上記以外の結核	3	0.2%	3	0.3%	1	0.6%	7	0.3%
ウイルス性肝炎	20	1.3%	17	1.7%	2	1.1%	39	1.5%
皮膚の感染症	10	0.7%	14	1.4%	2	1.1%	26	1.0%
急性胆嚢炎 <新規>	8	0.5%	3	0.3%	1	0.6%	12	0.4%
急性腹膜炎 <新規>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
急性肺炎 <新規>	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	1	0.0%
全体	1,491	100.0%	1,002	100.0%	178	100.0%	2,671	100.0%

(注)平成18年度集計表の、↑は平成17年度と比較して3%以上増加がみられたもの、↓は3%以上減少がみられたもの
左端に*のついた項目は、共通病院での比較と傾向の違いが見られたもの(矢印の向き又は矢印の有無)

感染症(複数回答)	平成17年度調査							
	医療区分1 (n=4,436)		医療区分2 (n=2,736)		医療区分3 (n=477)		合計 (n=7,649)	
抗生物質耐性菌感染(たとえばMRSA)	41	0.9%	90	3.3%	73	15.3%	204	2.7%
後天性免疫不全症候群(HIV感染含む)	0	0.0%	2	0.1%	1	0.2%	3	0.0%
上気道感染	26	0.6%	59	2.2%	19	4.0%	104	1.4%
敗血症	0	0.0%	6	0.2%	3	0.6%	9	0.1%
多剤耐性結核	0	0.0%	7	0.3%	0	0.0%	7	0.1%
上記以外の結核	9	0.2%	8	0.3%	0	0.0%	17	0.2%
ウイルス性肝炎	28	0.6%	33	1.2%	3	0.6%	64	0.8%
皮膚の感染症	34	0.8%	45	1.6%	15	3.1%	94	1.2%
全体	4,436	100.0%	2,736	100.0%	477	100.0%	7,649	100.0%

問題状況(複数回答)	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=1,491)		医療区分2 (n=1,002)		医療区分3 (n=178)		合計 (n=2,671)	
妄想	60	4.0%	61	6.1%	5	2.8%	126	4.7%
発熱	17	1.1%	93	9.3%	68	38.2%	178	6.7%
幻覚	39	2.6%	37	3.7%	6	3.4%	82	3.1%
嘔吐	0	0.0%	11	1.1%	8	4.5%	19	0.7%
胸水 <新規>	5	0.3%	12	1.2%	12	6.7%	29	1.1%
腹水 <新規>	4	0.3%	4	0.4%	2	1.1%	10	0.4%
高カルシウム血症(10.5mg/dℓ以上) <新規>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
悪疫質(癌を伴う) <新規>	1	0.1%	5	0.5%	2	1.1%	8	0.3%
消化管の通過障害(癌を伴う) <新規>	0	0.0%	2	0.2%	4	2.2%	6	0.2%
全体	1,491	100.0%	1,002	100.0%	178	100.0%	2,671	100.0%

(注)平成18年度集計表の、↑は平成17年度と比較して3%以上増加がみられたもの、↓は3%以上減少がみられたもの
左端に*のついた項目は、共通病院での比較と傾向の違いが見られたもの(矢印の向き又は矢印の有無)

問題状況(複数回答)	平成17年度調査							
	医療区分1 (n=4,436)		医療区分2 (n=2,736)		医療区分3 (n=477)		合計 (n=7,649)	
妄想	79	1.8%	113	4.1%	6	1.3%	198	2.6%
発熱	83	1.9%	342	12.5%	188	39.4%	613	8.0%
幻覚	53	1.2%	69	2.5%	4	0.8%	126	1.6%
嘔吐	0	0.0%	65	2.4%	32	6.7%	97	1.3%
全体	4,436	100.0%	2,736	100.0%	477	100.0%	7,649	100.0%

処置・治療(複数回答)	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=1,491)		医療区分2 (n=1,002)		医療区分3 (n=178)		合計 (n=2,671)	
抗がん剤療法	2	0.1%	3	0.3%	0	0.0%	5	0.2%
胃瘻、腎瘻、人工肛門などの瘻の処置	135	9.1%	203	20.3%	60	33.7%	398	14.9%
放射線治療	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.0%
*吸引(1日1～7回)	76	5.1%	81	8.1%	26	14.6%	183	6.9% ↓
輸血	1	0.1%	1	0.1%	0	0.0%	2	0.1%
緩和ケア	3	0.2%	6	0.6%	0	0.0%	9	0.3%
疼痛コントロール	24	1.6%	37	3.7%	2	1.1%	63	2.4%
膀胱留置カテーテル	47	3.2%	105	10.5%	39	21.9%	191	7.2%
血糖チェック(週1回～1日2回)	42	2.8%	44	4.4%	10	5.6%	96	3.6%
インスリン皮下注射	23	1.5%	45	4.5%	3	1.7%	71	2.7%
全体	1,491	100.0%	1,002	100.0%	178	100.0%	2,671	100.0%

(注)平成18年度集計表の、↑は平成17年度と比較して3%以上増加がみられたもの、↓は3%以上減少がみられたもの
左端に*のついた項目は、共通病院での比較と傾向の違いが見られたもの(矢印の向き又は矢印の有無)

処置・治療(複数回答)	平成17年度調査							
	医療区分1 (n=4,436)		医療区分2 (n=2,736)		医療区分3 (n=477)		合計 (n=7,649)	
抗がん剤療法	2	0.0%	3	0.1%	0	0.0%	5	0.1%
胃瘻、腎瘻、人工肛門などの瘻の処置	526	11.9%	603	22.0%	125	26.2%	1,254	16.4%
放射線治療	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
吸引(1日1～7回)	421	9.5%	379	13.9%	126	26.4%	926	12.1%
輸血	2	0.0%	3	0.1%	3	0.6%	8	0.1%
緩和ケア	39	0.9%	53	1.9%	18	3.8%	110	1.4%
疼痛コントロール	71	1.6%	72	2.6%	9	1.9%	152	2.0%
膀胱留置カテーテル	185	4.2%	304	11.1%	139	29.1%	628	8.2%
血糖チェック(週1回～1日2回)	186	4.2%	120	4.4%	22	4.6%	328	4.3%
インスリン皮下注射	116	2.6%	98	3.6%	15	3.1%	229	3.0%
全体	4,436	100.0%	2,736	100.0%	477	100.0%	7,649	100.0%

状態の安定性(複数回答)	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=1,491)		医療区分2 (n=1,002)		医療区分3 (n=178)		合計 (n=2,671)	
個室における管理が必要	15	1.0%	34	3.4%	15	8.4%	64	2.4%
急性症状が発生したり再発性や慢性の問題が再燃した	22	1.5%	62	6.2%	41	23.0%	125	4.7%
末期の疾患であり余命が6ヶ月以下である	7	0.5%	15	1.5%	14	7.9%	36	1.3%
全体	1,491	100.0%	1,002	100.0%	178	100.0%	2,671	100.0%

(注)平成18年度集計表の、↑は平成17年度と比較して3%以上増加がみられたもの、↓は3%以上減少がみられたもの
左端に*のついた項目は、共通病院での比較と傾向の違いが見られたもの(矢印の向き又は矢印の有無)

状態の安定性(複数回答)	平成17年度調査							
	医療区分1 (n=4,436)		医療区分2 (n=2,736)		医療区分3 (n=477)		合計 (n=7,649)	
絶対安静	8	0.2%	40	1.5%	70	14.7%	118	1.5%
個室における管理が必要	14	0.3%	31	1.1%	39	8.2%	84	1.1%
急性症状が発生したり再発性や慢性の問題が再燃した	69	1.6%	118	4.3%	121	25.4%	308	4.0%
末期の疾患であり余命が6ヶ月以下である	2	0.0%	7	0.3%	11	2.3%	20	0.3%
全体	4,436	100.0%	2,736	100.0%	477	100.0%	7,649	100.0%

栄養摂取の方法(複数回答)	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=1,491)		医療区分2 (n=1,002)		医療区分3 (n=178)		合計 (n=2,671)	
中心静脈栄養	0	0.0%	0	0.0%	34	19.1%	34	1.3%
末梢静脈栄養	12	0.8%	46	4.6%	61	34.3%	119	4.5%
* 経管栄養	286	19.2%	389	38.8%	77	43.3%	752	28.2% ↓
* いずれか1つ以上該当	295	19.8%	422	42.1%	146	82.0%	863	32.3% ↓
全体	1,491	100.0%	1,002	100.0%	178	100.0%	2,671	100.0%

(注)平成18年度集計表の、↑は平成17年度と比較して3%以上増加がみられたもの、↓は3%以上減少がみられたもの
左端に*のついた項目は、共通病院での比較と傾向の違いが見られたもの(矢印の向き又は矢印の有無)

栄養摂取の方法(複数回答)	平成17年度調査							
	医療区分1 (n=4,436)		医療区分2 (n=2,736)		医療区分3 (n=477)		合計 (n=7,649)	
中心静脈栄養	0	0.0%	0	0.0%	80	16.8%	80	1.0%
末梢静脈栄養	25	0.6%	70	2.6%	100	21.0%	195	2.5%
経管栄養	1,103	24.9%	1,158	42.3%	216	45.3%	2,477	32.4%
いずれか1つ以上該当	1,126	25.4%	1,218	44.5%	362	75.9%	2,706	35.4%
全体	4,436	100.0%	2,736	100.0%	477	100.0%	7,649	100.0%

リハビリテーションを要す状態 発症してからの日数	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=1,170)		医療区分2 (n=766)		医療区分3 (n=124)		合計 (n=2,060)	
14日以下	0	0.0%	4	0.5%	0	0.0%	4	0.2%
15日から30日以下	0	0.0%	6	0.8%	0	0.0%	6	0.3%
31日から90日以下	13	1.1%	7	0.9%	9	7.3%	29	1.4%
91日から180日以下	59	5.0%	38	5.0%	12	9.7%	109	5.3%
181日以上	1,092	93.3%	709	92.6%	103	83.1%	1,904	92.4% ↑
無回答	6	0.5%	2	0.3%	0	0.0%	8	0.4%
全体	1,170	100.0%	766	100.0%	124	100.0%	2,060	100.0%

(注)平成18年度集計表の、↑は平成17年度と比較して3%以上増加がみられたもの、↓は3%以上減少がみられたもの
左端に*のついた項目は、共通病院での比較と傾向の違いが見られたもの(矢印の向き又は矢印の有無)

リハビリテーションを要す状態 発症してからの日数	平成17年度調査							
	医療区分1 (n=3,019)		医療区分2 (n=1,733)		医療区分3 (n=240)		合計 (n=4,992)	
14日以下	0	0.0%	32	1.8%	2	0.8%	34	0.7%
15日から30日以下	0	0.0%	27	1.6%	5	2.1%	32	0.6%
31日から90日以下	74	2.5%	47	2.7%	7	2.9%	128	2.6%
91日から180日以下	134	4.4%	90	5.2%	12	5.0%	236	4.7%
181日以上	2,703	89.5%	1,483	85.6%	209	87.1%	4,395	88.0%
無回答	108	3.6%	54	3.1%	5	2.1%	167	3.3%
全体	3,019	100.0%	1,733	100.0%	240	100.0%	4,992	100.0%

日常の意思決定を行うための認知能力	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=1,491)		医療区分2 (n=1,002)		医療区分3 (n=178)		合計 (n=2,671)	
自立	135	9.1%	63	6.3%	11	6.2%	209	7.8%
限定的な自立	169	11.3%	89	8.9%	9	5.1%	267	10.0%
* 軽度の障害	162	10.9%	93	9.3%	13	7.3%	268	10.0%
中程度の障害	366	24.5%	184	18.4%	22	12.4%	572	21.4%
重度の障害	521	34.9%	405	40.4%	67	37.6%	993	37.2%
* 意識障害者	127	8.5%	161	16.1%	54	30.3%	342	12.8% ↓
無回答	11	0.7%	7	0.7%	2	1.1%	20	0.7%
全体	1,491	100.0%	1,002	100.0%	178	100.0%	2,671	100.0%

(注)平成18年度集計表の、↑は平成17年度と比較して3%以上増加がみられたもの、↓は3%以上減少がみられたもの
左端に*のついた項目は、共通病院での比較と傾向の違いが見られたもの(矢印の向き又は矢印の有無)

日常の意思決定を行うための認知能力	平成17年度調査							
	医療区分1 (n=4,436)		医療区分2 (n=2,736)		医療区分3 (n=477)		合計 (n=7,649)	
自立	337	7.6%	140	5.1%	20	4.2%	497	6.5%
限定的な自立	429	9.7%	178	6.5%	15	3.1%	622	8.1%
軽度の障害	449	10.1%	235	8.6%	23	4.8%	707	9.2%
中程度の障害	1,055	23.8%	560	20.5%	54	11.3%	1,669	21.8%
重度の障害	1,609	36.3%	1,077	39.4%	162	34.0%	2,848	37.2%
意識障害者	534	12.0%	529	19.3%	199	41.7%	1,262	16.5%
無回答	23	0.5%	17	0.6%	4	0.8%	44	0.6%
全体	4,436	100.0%	2,736	100.0%	477	100.0%	7,649	100.0%

5 詳細条件該当状況（平成18年度調査のみ）

VI.1 疾患 e. 慢性心不全

NYHA Ⅲ度/Ⅳ度	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=134)		医療区分2 (n=87)		医療区分3 (n=27)		合計 (n=248)	
1. Ⅲ度未満	102	76.1%	52	59.8%	16	59.3%	170	68.5%
2. Ⅲ度	22	16.4%	15	17.2%	7	25.9%	44	17.7%
3. Ⅳ度	3	2.2%	7	8.0%	3	11.1%	13	5.2%
(再掲) Ⅲ度+Ⅳ度	25	18.7%	22	25.3%	10	37.0%	57	23.0%
無回答	7	5.2%	13	14.9%	1	3.7%	21	8.5%
全体	134	100.0%	87	100.0%	27	100.0%	248	100.0%

VI.1 疾患 a b. 肺気腫/慢性閉塞性肺疾患 (COPD)

Hugh Jones Ⅳ度/Ⅴ度の状態	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=0)		医療区分2 (n=58)		医療区分3 (n=15)		合計 (n=73)	
1. Ⅳ度未満	0	-	43	74.1%	7	46.7%	50	68.5%
2. Ⅳ度	0	-	9	15.5%	3	20.0%	12	16.4%
3. Ⅴ度	0	-	3	5.2%	5	33.3%	8	11.0%
(再掲) Ⅳ度+Ⅴ度	0	-	12	20.7%	8	53.3%	20	27.4%
無回答	0	-	3	5.2%	0	0.0%	3	4.1%
全体	0	-	58	100.0%	15	100.0%	73	100.0%

VI.1 疾患 a e. 腎不全

高クレアチン血症2.0mg/dℓ以上	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=49)		医療区分2 (n=56)		医療区分3 (n=6)		合計 (n=111)	
0. なし	34	69.4%	35	62.5%	4	66.7%	73	65.8%
1. あり	15	30.6%	19	33.9%	2	33.3%	36	32.4%
無回答	0	0.0%	2	3.6%	0	0.0%	2	1.8%
全体	49	100.0%	56	100.0%	6	100.0%	111	100.0%

VI.1 疾患 a f. 肝不全

(1)ビリルビン	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=16)		医療区分2 (n=9)		医療区分3 (n=4)		合計 (n=29)	
1. <2	14	87.5%	9	100.0%	2	50.0%	25	86.2%
2. 2~3	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	1	3.4%
3. >3	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
無回答	2	12.5%	0	0.0%	1	25.0%	3	10.3%
全体	16	100.0%	9	100.0%	4	100.0%	29	100.0%

(2)アルブミン	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=16)		医療区分2 (n=9)		医療区分3 (n=4)		合計 (n=29)	
1. >3.5	5	31.3%	3	33.3%	0	0.0%	8	27.6%
2. 2.8~3.5	10	62.5%	5	55.6%	1	25.0%	16	55.2%
3. <2.8	1	6.3%	1	11.1%	2	50.0%	4	13.8%
無回答	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	1	3.4%
全体	16	100.0%	9	100.0%	4	100.0%	29	100.0%

(3)PT(%)	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=16)		医療区分2 (n=9)		医療区分3 (n=4)		合計 (n=29)	
1. >80	12	75.0%	6	66.7%	3	75.0%	21	72.4%
2. 60~80	0	0.0%	2	22.2%	0	0.0%	2	6.9%
3. <60	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
無回答	4	25.0%	1	11.1%	1	25.0%	6	20.7%
全体	16	100.0%	9	100.0%	4	100.0%	29	100.0%

(4)腹水	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=16)		医療区分2 (n=9)		医療区分3 (n=4)		合計 (n=29)	
1. なし	15	93.8%	6	66.7%	2	50.0%	23	79.3%
2. 軽度	0	0.0%	3	33.3%	0	0.0%	3	10.3%
3. 中等度	1	6.3%	0	0.0%	2	50.0%	3	10.3%
無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
全体	16	100.0%	9	100.0%	4	100.0%	29	100.0%

(5)脳症	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=16)		医療区分2 (n=9)		医療区分3 (n=4)		合計 (n=29)	
1. なし	15	93.8%	7	77.8%	2	50.0%	24	82.8%
2. Grade1-2	1	6.3%	2	22.2%	1	25.0%	4	13.8%
3. Grade3-4	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	1	3.4%
無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
全体	16	100.0%	9	100.0%	4	100.0%	29	100.0%

Child-Pugh分類 (上記5項目の合計スコア)	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=16)		医療区分2 (n=9)		医療区分3 (n=4)		合計 (n=29)	
1. Class A (5-6点)	11	68.8%	3	33.3%	1	25.0%	15	51.7%
2. Class B (7-9点)	1	6.3%	5	55.6%	1	25.0%	7	24.1%
3. Class C (10-15点)	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	1	3.4%
無回答	4	25.0%	1	11.1%	1	25.0%	6	20.7%
全体	16	100.0%	9	100.0%	4	100.0%	29	100.0%

VI.2 感染症 h. 尿路感染症

(1)細菌尿/白血球尿(>10/HPF)の該当状況 (発症中に一度でも認められたかどうか)	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=0)		医療区分2 (n=71)		医療区分3 (n=13)		合計 (n=84)	
1. 両方該当なし	0	-	9	12.7%	1	7.7%	10	11.9%
2. 細菌尿のみ該当	0	-	3	4.2%	0	0.0%	3	3.6%
3. 白血球尿(>10/HPF)のみ該当	0	-	5	7.0%	0	0.0%	5	6.0%
4. 両方該当	0	-	53	74.6%	11	84.6%	64	76.2%
無回答	0	-	1	1.4%	1	7.7%	2	2.4%
全体	0	-	71	100.0%	13	100.0%	84	100.0%

VII.1 問題状況 a. 脱水

(1)舌の乾燥 (発症中に一度でも認められたかどうか)	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=0)		医療区分2 (n=77)		医療区分3 (n=27)		合計 (n=104)	
0. なし	0	-	31	40.3%	7	25.9%	38	36.5%
1. あり	0	-	46	59.7%	18	66.7%	64	61.5%
無回答	0	-	0	0.0%	2	7.4%	2	1.9%
全体	0	-	77	100.0%	27	100.0%	104	100.0%

(2)皮膚の乾燥 (発症中に一度でも認められたかどうか)	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=0)		医療区分2 (n=77)		医療区分3 (n=27)		合計 (n=104)	
0. なし	0	-	9	11.7%	2	7.4%	11	10.6%
1. あり	0	-	68	88.3%	23	85.2%	91	87.5%
無回答	0	-	0	0.0%	2	7.4%	2	1.9%
全体	0	-	77	100.0%	27	100.0%	104	100.0%

(3)尿量減少 (発症中に一度でも認められたかどうか)	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=0)		医療区分2 (n=77)		医療区分3 (n=27)		合計 (n=104)	
0. なし	0	-	46	59.7%	15	55.6%	61	58.7%
1. あり	0	-	31	40.3%	10	37.0%	41	39.4%
無回答	0	-	0	0.0%	2	7.4%	2	1.9%
全体	0	-	77	100.0%	27	100.0%	104	100.0%

(4)BUN/Cre比の上昇 (発症中に一度でも認められたかどうか)	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=0)		医療区分2 (n=77)		医療区分3 (n=27)		合計 (n=104)	
0. なし	0	-	65	84.4%	18	66.7%	83	79.8%
1. あり	0	-	12	15.6%	7	25.9%	19	18.3%
無回答	0	-	0	0.0%	2	7.4%	2	1.9%
全体	0	-	77	100.0%	27	100.0%	104	100.0%

項目該当状況 (発症中に一度でも認められたかどうか)	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=0)		医療区分2 (n=77)		医療区分3 (n=27)		合計 (n=104)	
1. 0項目該当	0	-	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2. 1項目該当	0	-	27	35.1%	5	18.5%	32	30.8%
3. 2項目該当	0	-	27	35.1%	11	40.7%	38	36.5%
4. 3項目該当	0	-	16	20.8%	5	18.5%	21	20.2%
5. 4項目該当	0	-	7	9.1%	4	14.8%	11	10.6%
無回答	0	-	0	0.0%	2	7.4%	2	1.9%
全体	0	-	77	100.0%	27	100.0%	104	100.0%

VII.1 問題状況 f. 嘔吐

1日の間に繰り返しの嘔吐	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=0)		医療区分2 (n=11)		医療区分3 (n=8)		合計 (n=19)	
0. なし	0	-	8	72.7%	5	62.5%	13	68.4%
1. あり	0	-	3	27.3%	3	37.5%	6	31.6%
無回答	0	-	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
全体	0	-	11	100.0%	8	100.0%	19	100.0%

VIII.2 栄養摂取の方法 a. 中心静脈栄養

消化管異常、悪性腫瘍等により消化管からの栄養摂取が困難である	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=0)		医療区分2 (n=0)		医療区分3 (n=34)		合計 (n=34)	
0. なし	0	-	0	-	13	38.2%	13	38.2%
1. あり	0	-	0	-	16	47.1%	16	47.1%
無回答	0	-	0	-	5	14.7%	5	14.7%
全体	0	-	0	-	34	100.0%	34	100.0%

X.2 注射・点滴 e. 24時間の持続点滴

経口摂取が困難/体液の不均衡(電解質異常等)の状況 (点滴を行った際に認められたかどうか)	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=0)		医療区分2 (n=0)		医療区分3 (n=111)		合計 (n=111)	
1. 両方該当なし	0	-	0	-	4	3.6%	4	3.6%
2. 経口摂取が困難のみ該当	0	-	0	-	55	49.5%	55	49.5%
3. 体液の不均衡(電解質異常等)のみ該当	0	-	0	-	1	0.9%	1	0.9%
4. 両方該当	0	-	0	-	43	38.7%	43	38.7%
無回答	0	-	0	-	8	7.2%	8	7.2%
全体	0	-	0	-	111	100.0%	111	100.0%

X II.1 処置・治療 e. 酸素療法

(1)安静時でSaO ₂ 90%以下に該当	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=0)		医療区分2 (n=0)		医療区分3 (n=58)		合計 (n=58)	
0. なし	0	-	0	-	23	39.7%	23	39.7%
1. あり	0	-	0	-	35	60.3%	35	60.3%
無回答	0	-	0	-	0	0.0%	0	0.0%
全 体	0	-	0	-	58	100.0%	58	100.0%

(2)睡眠時でSaO ₂ 90%以下に該当	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=0)		医療区分2 (n=0)		医療区分3 (n=58)		合計 (n=58)	
0. なし	0	-	0	-	27	46.6%	27	46.6%
1. あり	0	-	0	-	31	53.4%	31	53.4%
無回答	0	-	0	-	0	0.0%	0	0.0%
全 体	0	-	0	-	58	100.0%	58	100.0%

(3)運動負荷時でSaO ₂ 90%以下に該当	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=0)		医療区分2 (n=0)		医療区分3 (n=58)		合計 (n=58)	
0. なし	0	-	0	-	39	67.2%	39	67.2%
1. あり	0	-	0	-	19	32.8%	19	32.8%
無回答	0	-	0	-	0	0.0%	0	0.0%
全 体	0	-	0	-	58	100.0%	58	100.0%

3項目該当状況	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=0)		医療区分2 (n=0)		医療区分3 (n=58)		合計 (n=58)	
0. いずれも該当なし	0	-	0	-	20	34.5%	20	34.5%
1. 1つ以上に該当	0	-	0	-	38	65.5%	38	65.5%
無回答	0	-	0	-	0	0.0%	0	0.0%
全 体	0	-	0	-	58	100.0%	58	100.0%

X II.1 処置・治療 g. 吸引

(1) 過去7日間のうち1日の最大回数 (回数毎患者数)	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=77)		医療区分2 (n=275)		医療区分3 (n=100)		合計 (n=452)	
0回	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
1回	3	3.9%	6	2.2%	1	1.0%	10	2.2%
2回	6	7.8%	9	3.3%	3	3.0%	18	4.0%
3回	19	24.7%	21	7.6%	2	2.0%	42	9.3%
4回	13	16.9%	10	3.6%	3	3.0%	26	5.8%
5回	21	27.3%	14	5.1%	11	11.0%	46	10.2%
6回	9	11.7%	11	4.0%	5	5.0%	25	5.5%
7回	5	6.5%	10	3.6%	1	1.0%	16	3.5%
8回	0	0.0%	35	12.7%	17	17.0%	52	11.5%
9回	0	0.0%	8	2.9%	6	6.0%	14	3.1%
10回	0	0.0%	37	13.5%	8	8.0%	45	10.0%
11回	0	0.0%	6	2.2%	0	0.0%	6	1.3%
12回	0	0.0%	34	12.4%	6	6.0%	40	8.8%
13回	0	0.0%	18	6.5%	5	5.0%	23	5.1%
14回	0	0.0%	15	5.5%	5	5.0%	20	4.4%
15回	0	0.0%	17	6.2%	8	8.0%	25	5.5%
16回	0	0.0%	7	2.5%	2	2.0%	9	2.0%
17回	0	0.0%	4	1.5%	0	0.0%	4	0.9%
18回	0	0.0%	3	1.1%	5	5.0%	8	1.8%
19回	0	0.0%	1	0.4%	2	2.0%	3	0.7%
20回	0	0.0%	0	0.0%	5	5.0%	5	1.1%
21回以上	0	0.0%	8	2.9%	5	5.0%	13	2.9%
無回答	1	1.3%	1	0.4%	0	0.0%	2	0.4%
全体	77	100.0%	275	100.0%	100	100.0%	452	100.0%
平均値	4.2		9.8		11.1		9.1	
標準偏差	1.5		4.9		6.2		5.4	
最大値	7		30		36		36	
最小値	1		1		1		1	

(2) 過去7日間のうち1日の最大回数 (累積度数)	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=77)		医療区分2 (n=275)		医療区分3 (n=100)		合計 (n=452)	
0回	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
1回	3	3.9%	6	2.2%	1	1.0%	10	2.2%
2回	9	11.7%	15	5.5%	4	4.0%	28	6.2%
3回	28	36.4%	36	13.1%	6	6.0%	70	15.5%
4回	41	53.2%	46	16.7%	9	9.0%	96	21.2%
5回	62	80.5%	60	21.8%	20	20.0%	142	31.4%
6回	71	92.2%	71	25.8%	25	25.0%	167	36.9%
7回	76	98.7%	81	29.5%	26	26.0%	183	40.5%
8回	76	98.7%	116	42.2%	43	43.0%	235	52.0%
9回	76	98.7%	124	45.1%	49	49.0%	249	55.1%
10回	76	98.7%	161	58.5%	57	57.0%	294	65.0%
11回	76	98.7%	167	60.7%	57	57.0%	300	66.4%
12回	76	98.7%	201	73.1%	63	63.0%	340	75.2%
13回	76	98.7%	219	79.6%	68	68.0%	363	80.3%
14回	76	98.7%	234	85.1%	73	73.0%	383	84.7%
15回	76	98.7%	251	91.3%	81	81.0%	408	90.3%
16回	76	98.7%	258	93.8%	83	83.0%	417	92.3%
17回	76	98.7%	262	95.3%	83	83.0%	421	93.1%
18回	76	98.7%	265	96.4%	88	88.0%	429	94.9%
19回	76	98.7%	266	96.7%	90	90.0%	432	95.6%
20回	76	98.7%	266	96.7%	95	95.0%	437	96.7%
21回以上	76	98.7%	274	99.6%	100	100.0%	450	99.6%
無回答	77	100.0%	275	100.0%	100	100.0%	452	100.0%
全体	77	100.0%	275	100.0%	100	100.0%	452	100.0%

X II.1 処置・治療 o. 血糖チェック

(1) 過去7日間のうち1日の最大回数 (回数毎患者数)	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=43)		医療区分2 (n=81)		医療区分3 (n=13)		合計 (n=137)	
0回	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
1回	28	65.1%	37	45.7%	8	61.5%	73	53.3%
2回	14	32.6%	7	8.6%	2	15.4%	23	16.8%
3回	0	0.0%	25	30.9%	2	15.4%	27	19.7%
4回	0	0.0%	7	8.6%	0	0.0%	7	5.1%
5回	0	0.0%	1	1.2%	0	0.0%	1	0.7%
6回以上	0	0.0%	3	3.7%	1	7.7%	4	2.9%
無回答	1	2.3%	1	1.2%	0	0.0%	2	1.5%
全体	43	100.0%	81	100.0%	13	100.0%	137	100.0%
平均値	1.3		2.3		2.5		2.0	
標準偏差	0.5		1.6		3.8		1.8	
最大値	2		10		15		15	
最小値	1		1		1		1	

(2) 過去7日間のうち1日の最大回数 (累積度数)	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=43)		医療区分2 (n=81)		医療区分3 (n=13)		合計 (n=137)	
0回	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
1回	28	65.1%	37	45.7%	8	61.5%	73	53.3%
2回	42	97.7%	44	54.3%	10	76.9%	96	70.1%
3回	42	97.7%	69	85.2%	12	92.3%	123	89.8%
4回	42	97.7%	76	93.8%	12	92.3%	130	94.9%
5回	42	97.7%	77	95.1%	12	92.3%	131	95.6%
6回以上	42	97.7%	80	98.8%	13	100.0%	135	98.5%
無回答	43	100.0%	81	100.0%	13	100.0%	137	100.0%
全体	43	100.0%	81	100.0%	13	100.0%	137	100.0%