

| 日本からの提案 | ID | 提案題名 | 第1に影響を受けるコード | 第2に影響を受けるコード | 提案内容の概要 | 投票 (第1回 6/30) | 投票 (第2回) | WHO最終決定 (勧告、否決、取 下げ、特選) |
|----------------------------|------|---|--------------|--------------|---|---------------------|-------------|-------------------------------|
| 第XII章 皮膚及び皮下組織の疾患(L00-L99) | | | | | | | | |
| | 1440 | Parakeratosis 錯角化(症) | L41 | None | 錯角化(症)(索引P233) -斑(紋)状のコードをL41. 0→ L41. 5に変更 | ○ | ○ | ○ |
| | 1454 | Schweneringer buzzi anetoderma シュヴェニングガー・ブジィ斑状皮膚萎縮 | L90.1 | None | | ○ | ○ | ○ |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|------|---|-------|-------|--|---|---|---|
| 第XIII章 筋骨格系及び結合組織の疾患(M00-M99) | | | | | | | | |
| | 1296 | Exclusion of pressure ulcers from M70 M70から褥瘡を削除 | M70 | None | 明確性の改善又は不明確性の軽減の観点から、受圧部の(誤った)分類(解釈?)の可能性のあるもの全てを除去する。第2巻(内容例示)P557の「使用、使い過ぎ及び圧迫に関連する軟部組織障害(M70)のコードの、「除外:」に「褥瘡性潰瘍及び受圧部」を追記し、表リストの充実を図ることを提案する。 | ○ | ○ | ○ |
| | 1399 | Gout 痛風 | M10 | None | 索引(629頁、他)に追加 眼の術後の疾患H59. 8Iにして追加 | ○ | ○ | ○ |
| | 1439 | Nodular nonsuppurative panniculitis 結節性非化膿性皮下脂肪織炎 | M79 | M35.6 | 皮下脂肪組織炎(索引P42) -ウェーバー・クリスチャン病 M35. 6を追加 | △ | ○ | ○ |
| | 1450 | Radiculitis due to intervertebral disc displacement 椎間板ヘルニアの変形による神経炎 | M54.1 | None | 神経根炎の下の項に新規コードを追加、及び剣・星を追加 -椎間板ヘルニア(変位)によるもの M51.1† G55.1* -腰(部)、腰仙(部)NEC M54.1† G55.3* -胸(部)(内臓痛を伴うもの)NEC M54.1† G55.2* | △ | △ | × |
| | 1464 | Pseudotrichinosis 偽性旋毛虫症 | M33.1 | None | 索引語の追加 | ○ | ○ | ○ |
| | 1223 | Osteonecrosis of jaw due to bisphosphonates ビスフォスフォネートによる顎の骨えく壊死 | K10.2 | M87.1 | 内容例示(453)修正 コードK102のところへ除外文・・・「薬物による顎骨えく壊死(M87.1)」の追加 コードM87.1のところへ包含文の追加 | △ | △ | ○ |
| | 1377 | Complications of orthopedic device 整形外科的器具の合併症 | T84 | M79.9 | 索引の修正 索引の精度向上のため、コードの削除と変更。フランス版CIM-10の方が正しいと思われる。 合併症 -整形外科 M79.9 削除 -器具、挿入物または移植片T84.9→T85.9 -整形外科インターンT84.9 -機械的T84.3→T84.4 整形外科の機械的合併症 索引と内容例示が不一致 索引・・・T84.3 内容例示・・・T84.4 | △ | ○ | ○ |
| | 1428 | Sciatic neuritis 坐骨神経炎 | G57.0 | M54.3 | 坐骨神経痛性神経炎はICD-10でM54. 3となっているが、CIM-10ではG57. 0となっている。どちらが正しいのか。 | △ | △ | ○ |

| 日本からの提案 | ID | 提案題名 | 第1に影響を受けるコード | 第2に影響を受けるコード | 提案内容の概要 | 投票 (第1回 6/30) | 投票 (第2回) | WHO最 終決定 (勧告、否決、取 下げ、再編し) |
|---------------------------|------|--|--------------|--------------|--|---------------------|-------------|------------------------------------|
| 第XIV章 腎尿路生殖器系の疾患(N00-N99) | | | | | | | | |
| | 1058 | Prostatitis 前立腺炎 | N41 | None | | △ | × | × |
| | 1257 | Calculus of kidney obvious consequence of multiple sclerosis 多発性硬化症の明らかな結果である腎結石 | N20 | G35 | | △ | △ | ○ |
| | 1258 | Urinary tract infection an obvious consequence of osteogenesis imperfecta 骨形成不全症の明らかな結果である尿路感染症 | N39.0 | Q78.0 | | △ | △ | ○ |
| | 1263 | Lithium treatment and bipolar affective disorder リチウム治療と双極性感情障害 | N25.1 | Y49.5 | | △ | △ | ○ |
| | 1359 | Vaginorectal abscess 膣直腸膿瘍 | N76 | K61.1 | 索引の修正 The following entries pose a problem. 膣直腸膿瘍のコードは何か？ フランスの索引では、K61. 1になっているが… 膣か直腸か？どちらが正しいの？。 索引 P568, P572 膿瘍(塞栓症)(感染(性))(転移(性))(多発(性))(化膿性)(敗血症性) L02. 9 -膣(壁)(膣炎も参照) N76. 0 -膣直腸(膣炎も参照) N76. 0 ⇒ K61. 1 | △ | △ | ○ |
| | 1372 | Kidney block 腎ブロック | N19 | None | URC#1241において、“kidney disease”という用語を新しくしたため、索引を変更。(renal→kidney) ブロック -腎 について変更を行った | ○ | ○ | ○ |
| | 1387 | Organic erectile dysfunction 器質性勃起不全 | N48.4 | F52.2 | 索引項目の追加(器質性と心因性を分けてコードできるように) | △ | ○ | ○ |
| | 1398 | Further follow up to changes for chronic kidney disease 慢性腎疾患という用語の変更の追記 | N19 | None | 「慢性腎疾患」という用語の変更の追記「renal」→「kidney」 | ○ | ○ | ○ |
| | 1426 | Calculous pyelonephritis 結石腎盂腎炎 | N20 | None | 結石性腎盂腎炎は、腎路(腎盂～膀胱)内で石によって起こるため、例示をN20. 9からN20に変更 | ○ | ○ | ○ |
| | 1469 | Vulvar vestibulitis 膣前庭炎 | N76.8 | None | 前庭炎 -膣 N76. 8を追加 (索引P445、内容例示P600) | ○ | ○ | ○ |

| 日本からの提案 | ID | 提案題名 | 第1に影響を受けるコード | 第2に影響を受けるコード | 提案内容の概要 | 投票 (第1回 6/30) | 投票 (第2回) | WHO最終決定 (勧告、否決、取 下げ、挿越し) |
|------------------------------|------|--|--------------|--------------------------------|--|---------------------|-------------|--------------------------------|
| 第XV章 妊娠、分娩及び産じょく<褥>(O00-O99) | | | | | | | | |
| | 1183 | Morbidly adherent placenta 病的付着胎盤 | O43 | None | 内容例示(631)、索引修正(コード)新規コード追加 癒着胎盤、穿通胎盤および嵌入胎盤が分娩中または分娩後に遺残胎盤として問題を引き起こす前の分娩前の病態としての癒着胎盤および嵌入胎盤の分類 「病的な付着胎盤を分類」 | ○ | ○ | ○ |
| | 1187 | HIV complicating pregnancy, childbirth and the puerperium 妊娠、出産及び産じょく<褥>に合併するHIV | O98 | None | 内容例示O98の「除外」の記載変更 コード新設・O98. 7「妊娠、出産及び産じょくに合併するHIV」 | ○ | ○ | ○ |
| | 1189 | Pre-eclampsia and hypertension in pregnancy 妊娠中の子かん<痼>前症及び高血圧症 | O10-O16 | None | 内容例示(619~)、索引(244)の修正 たんぱく尿を必要条件としない。 O10 O11 O13 O14 コードの項目内容や除外の修正。索引の修正。 子かん前<痼>前症の中等度の削除、修正(軽度と重度のみにする)軽度についてはコード変更O13→O14. 0へ HELLP症候群のコード変更O14. 1→O14. 2(新規コード)へ | △ | ○ | 論議継続中 |
| 取り下げ | 1335 | Monochorionic monoamniotic twins, Monochorionic diamniotic twins and Dichorionic diamniotic twins 一絨毛膜一羊膜双胎、一絨毛膜二羊膜双胎、二絨毛膜二羊膜双胎 | O30.0 | None | 内容例示(625頁)の例示の追加及び索引の追加 O300の例示に追加し索引の該当箇所にも追加する。 | ○ | ○ | × |
| | 1354 | Cord around neck, with and without compression 圧迫を伴う、伴わない臍帯頸部巻絡 | O69 | None | O69-の明確化 「臍帯圧迫その他」はO692orO698? | △ | △ | ○ |
| | 1376 | Eclamptic coma 子痲性昏睡 | O15 | R56.8 | 索引の精度向上のためコードの変更 昏睡 R40.2 -子かん<痼>性R56.8→O15.9 子かん、子かん性(昏睡)O15.9 -男性 R56.8 削除 索引の引き方でR56.8 O15.9 になる 一貫性が必要ではないか | △ | ○ | ○ |
| | 1430 | Continuing pregnancy following selective reduction 胎児の選択的な墮胎後の妊娠継続 | O31 | None | 新しい疾患を識別するため用語の追加及び新規コードを追加 O31. 1 一胎以上の「自然」流産後の妊娠継続:「自然」を追加 O31. 3 一胎以上の選択的な墮胎(胎児の減少)後の妊娠継続 妊娠 - 下記の後に継続するもの ---胎以上の選択的な墮胎O31.3 ---胎以上の自然流産O31 を追加 同様のコードにO04(医学的人工流産)があるが、新コードの追加により、すべての胎児の中絶とする | △ | △ | × |
| | 1432 | Postpartum occlusion of precerebral artery 分娩後の脳実質外動脈の閉塞 | O99.4 | None | 分娩後の脳実質外動脈の閉塞のコードをO88. 2→O99. 4に変更 CIM-10ではO99. 4となっている | △ | △ | × |
| | 1240 | Septic shock 敗血症性ショック | R57 | A41.9 O08 T80.1 T81.1 | 内容例示(27, 757)修正、コード変更 「敗血症ショック」のコード変更。 今現在 A419にコードしているが、R57. 2を新設して、そこにコードする。 | △ | △ | ○ |

| 日本からの提案 | ID | 提案題名 | 第1に影響を受けるコード | 第2に影響を受けるコード | 提案内容の概要 | 投票 (第1回 6/30) | 投票 (第2回) | WHO最 終決定 (勧告、否決、取 下げ、再議) |
|---------------------------|------|--|--------------|--------------|--|---------------------|-------------|-----------------------------------|
| 第XVI章 周産期に発生した病態(P00-P96) | | | | | | | | |
| | 1155 | Edema of brain of fetus or newborn 胎児及び新生児の脳浮腫 | P52.4 | P91.8 | 索引(639)の修正(項目、コード) P52.4には「出血」とあり、浮腫とは異なる病態であるため、新生児はP91.8としたい。 また、胎児に当てはまるコードがないため、提案があれば歓迎したい。 浮腫(水腫)性 -脳 --胎児(無酸素症又は低酸素症) 新規コード --胎児又は新生児(無酸素症又は低酸素症)P52.4→P91.8 トリエステ会議においてURCメンバーは、胎児または新生児の脳浮腫の分類をP91.0にすることに同意したが、P91.6を考慮していなかったため、この提案は2008年に持ち越された。 | △ | △ | 論議継続中 |
| | 1201 | Idiopathic neonatal hepatitis 突発性新生児肝炎 | P59.2 | None | 内容例示(672)修正 コードP59. 2のところへ「新生児(突発性)(巨細胞)(中毒性)肝炎」と詳細説明追加 | ○ | ○ | ○ |
| | 1259 | P95 and validity in mortality statistics 死亡統計におけるP95の有用性 | P95 | None | | △ | △ | ○ |
| | 1292 | Neonatal Abstinence Syndrome (NAS) 新生児離脱症候群 | P96 | None | 新生児離脱症候群(NAS)はICDコードを使用する病院の疾病率データベースにおいて過少評価されている。特にメ 外を服用する女性が出産した新生児のデータの過少コード化は明白である。第2巻(内容例示)P678の既存コー ドに「新生児離脱症候群(NAS)」を追記し、表リストの充実を図ることを提案する。 | ○ | ○ | ○ |
| | 1361 | Chemical absorption through the placenta 胎盤を通しての化学物質の吸収 | P04 | None | 索引の修正 There is a discrepancy in the two indices. <u>どちらが正しいの?</u> 索引 P138 吸収<absorption> -化学(物質)性 T65. 9 --胎盤通過(胎児または新生児) P04. 8 ⇒ P04. 9 ---妊娠管理への影響の疑い O35. 8 | △ | △ | ○ |
| | 1410 | Hyperfibrinolysis and hypofibrinogenemia affecting fetus or newborn 胎児又は新生児に影響する線維素溶解亢進症及び低フィブリ ノゲン血症 | P02 | None | 索引追加訂正 胎児又は新生児に影響する無フィブリノーゲン血症をP038→P021に変更 | △ | ○ | ○ |
| | 1417 | Congenital infections 先天性感染症 | P35-P39 | None | 索引の修正(仏CIMとの比較)(93~101頁) クロストリジウム、サルモネラ、レンサ球菌、大腸菌の先天性の感染症のコードが違う。ICDはどれもP398。C IMIはそれぞれP365、P638、P361、P364に分かれる | △ | △ | × |

| 日本からの提案 | ID | 提案題名 | 第1に影響を受けるコード | 第2に影響を受けるコード | 提案内容の概要 | 投票 (第1回 6/30) | 投票 (第2回) | WHO最終決定 (勧告、否決、取 下げ、持越し) |
|--------------------------------|------|--|--------------|----------------|---|---------------------|-------------|--------------------------------|
| | 1436 | Gastroesophageal reflux of the newborn 新生児の逆流性食道炎 | P78.8 | None | P78.8の例示に新生児の逆流性食道炎を追加 逆流(索引P137) -食道 -新生児 P78.8 -胃食道 --新生児の P78.8 を追加 周産期に発生した病態(索引P274) -新生児の逆流性食道炎 P78.8 -新生児食道性潰瘍 P78.8を追加 | ○ | ○ | ○ |
| | 1486 | Fetus and newborn affected by prolapsed cord 臍帯脱出による胎児及び新生児への影響 | P02.4 | None | ①Insertion(付着)に -臍帯の外側もしくは卵膜への(胎盤、異常も参照) O43.1を追加 CIM-10ではO69.4となっている。どちらが正しいのか。 ②胎盤の異常により影響を受けた胎児及び新生児は、ICD-10でP02.2となっているが、CIM-10ではP02.4となっている。どちらが正しいのか。 | △ | × | × |
| 第XVII章 先天奇形、変形及び染色体異常(Q00-Q99) | | | | | | | | |
| | 1284 | osteosclerosis congenital 先天性骨硬化症 | Q77.4 | 17 | 軟骨低形成症や軟骨過形成症(Q774)に関連しない特殊な先天性骨硬化症は学識的に見受けられないため、Q774に「先天性骨硬化症」を追記することを提案する。(第2巻P723) | △ | × | × |
| | 1147 | Pulmonary vein atresia 肺静脈閉鎖症 | Q26.3 | Q26.2 | | △ | — | × |
| | 1163 | VATER syndrome VATER症候群 | Q87.2 | Q87.8 | 内容例示(730)の例示変更、コード変更、索引(13)修正 VATER SYNDROMEは今日ではVATER ASSOCIATIONとして知られるが、これはそれぞれの奇形の間に関連性が症候群ほど強くないということである。VATER associationタイプの奇形のある患者は四肢の奇形が多数にのぼらない。したがってVATERをQ87.2から移しassociationを追加することを提案する。 | △ | △ | 稀な疾患 TAGへ |
| | 1164 | Congenital occlusion of ureterovesical orifice 尿管膀胱開口部の先天性閉鎖 | Q62.1 | Q62.2 | 内容例示(711)、索引(664)変更、コード変更 尿管膀胱開口部の先天(性)閉鎖は先天性巨大尿管から独立しては存在しないと主張している。尿管膀胱開口部の先天性狭窄の場合はそれだけが存在して巨大尿管がない場合もあり、異なっている。 | △ | ○ | 論議継続中 |
| | 1283 | Angelman syndrome アンジェルマン症候群 | Q93.5 | Q93.6 Q87.8 | WHOは、「アンジェルマン症候群」について「その他の染色体部分欠失」(Q935)のコード化を奨励しているが、片方の親ダイミー又はUBE3A異常により引き起こされることもあるため、「その他の明示された先天奇形症候群、他に分類されないもの」(Q878)にコード化し、微少欠失があれば「有糸分裂前中期のみにみられる欠失」(Q936)にコード化することを提案する。(第2巻P730) | △ | ○ | 稀な疾患 TAGへ |
| | 1285 | Dandy-Walker ダンディ・ウォーカー | Q03.1 | Q04.3 | ダンディ・ウォーカー症候群(Q031)は、脳の構造上の奇形-小脳の縮小欠損であり、水頭無脳症を伴わない事例も相当数あるため、Q031から「脳のその他の減形成」(Q043)のコードに変更する旨WHOに奨励したい。(第2巻P680-681) | △ | △ | 稀な疾患 TAGへ |
| | 1353 | Flexion deformity of hip 腰部の屈曲変形 | Q65.8 | Q65.9 | 先天性股関節部または大腿部変形をQ659→Q658に変更。先天性股関節部屈曲Q658にあわせる。 | ○ | ○ | ○ |

| 日本からの提案 | ID | 提案題名 | 第1に影響を受けるコード | 第2に影響を受けるコード | 提案内容の概要 | 投票 (第1回 6/30) | 投票 (第2回) | WHO最終決定 (勧告、否決、取 下げ、特選) |
|---------|------|--|--------------|--------------|--|---------------------|-------------|-------------------------------|
| | 1362 | Congenital adhesions of the meninges 髄膜の先天性癒着 | Q07 | None | 索引の修正 The issue is with the codes in the indices. フランスの索引はもっと細かくして。 索引 P719, P720 癒着<adhesions>、癒着性(感染後) K66. 0 — 髄膜(脳)(脊髄) G96. 1 — 先天(性) Q07. 8 Q048, Q068にも分類する | △ | ○ | ○ |
| | 1401 | Congenital hallux valgus 先天性外反母趾 | Q66 | None | 索引の修正(496頁) 先天性外反母趾に当たる索引の修正 中足 — 外反(内転)(先天性)Q666 外転 | ○ | ○ | ○ |
| | 1414 | Hypoplastic eustachian tube 耳管の低形成 | Q16.4 | None | 索引(511頁)の修正(コード変更) 「耳管の低形成」のコードは何か? ICDではQ178になっているが、仏CIMではQ164になっている。Q164に修正したい。 | ○ | ○ | ○ |
| 取り下げ | 1437 | Pallister-Killian syndrome パリスター・キリアン症候群 | Q99.8 | None | 緩和ケア(Z51. 5) -パリスター・キリアン症候群を追加 第3→疾患に テシュラー・ニコラ症候群 Q99. 8を追加 | — | — | × |
| | 1447 | Supravalvular pulmonary stenosis 肺動脈弁上狭窄 | Q25.6 | None | Q25. 6 肺動脈狭窄(症)の例示に肺動脈弁上狭窄を追加 狭窄 -肺 --大動脈(先天性) Q25. 6に(弁上)を追加 | ○ | ○ | ○ |
| | 1448 | Multicystic kidney disease 多嚢胞性腎疾患 | Q61.4 | None | Q61. 4に例示及び除外を追加(内容例示P711) 嚢胞及び異形成に項を追加(索引P588~) | △ | ○ | ○ |
| | 1455 | Incomplete segmentation of bone 骨の不完全分割 | Q65-Q79 | None | 骨の不完全分割はICD-10でQ78. 8となっているが、CIM-10ではQ79. 8となっている。 <u>どちらが正しいのか。</u> (索引P646) | △ | △ | 論議継続中 |
| | 1482 | Pseudoerosion of the cervix 子宮頸部の偽びらん | Q51.8 | None | CIM-10で、子宮頸の偽びらん Q51. 8となっているが、ICD-10にはない。 ICD-10に追加されるべきか。 | △ | △ | ○ |

| 日本からの提案 | ID | 提案題名 | 第1に影響を受けるコード | 第2に影響を受けるコード | 提案内容の概要 | 投票 (第1回 6/30) | 投票 (第2回) | WHO最 終決定 (勧告、否決、取 下げ、待越し) |
|--|------|---|--------------|--------------------------------|---|---------------------|-------------|------------------------------------|
| | 1488 | Jackson's membrane or veil ジャクソン膜又はベール | Q43 | None | 索引語の変更 ジャクソン 膜またはベール Q43.3 -膜またはベール Q43.3 -麻痺(症候群) G57.2 を追加 | △ | △ | ○ |
| | 1258 | Urinary tract infection an obvious consequence of osteogenesis imperfecta 骨形成不全症の明らかな結果である尿路感染症 | N39.0 | Q78.0 | | △ | △ | ○ |
| 第XVIII章 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの(R00-R99) | | | | | | | | |
| | 1240 | Septic shock 敗血症性ショック | R57 | A41.9 O08 T80.1 T81.1 | 内容例示(27頁, 757頁)修正、コード変更 「敗血症ショック」のコード変更。 今現在 A419にコードしているが、R57.2を新設して、そこにコードする。 | △ | △ | ○ |
| | 1347 | SIDS codes 乳幼児突然死症候群のコード | R95 | None | 解剖の有無でコードを分けるのは決定の方向。例示の洗い出しをしたい | △ | △ | MRGへ |
| 取り下げ | 1369 | Astereognosis 立体感覚失認 | R48.8 | R41.3 | 索引の修正 索引 P736 立体(感)覚消失<立体失認> R41.3 ⇒ R48.8 | - | - | x |
| | 1371 | Vasomotor attack 血管運動発作 | R57 | R55 | 血管運動(性)発作はICD-10でR57.9となっているが、CIM-10ではR55となっている。どちらが正しいのか。 | ○ | △ | ○ |
| | 1381 | Abnormal blood cell counts 異常血球数 | R72 | None | これは、ICD-9-CMからほぼ採用されているが、「異常血球算定」は身体の異常ではないため第XVIII章に分類にすべきである。D72(白血球遺伝性異常)の「除外:」に「異常白血球分化NOSのうち、減少及び高値」(R72)を追記することを提案する。(※ICD-9-CMから採用の方向)(第2巻P158及び第3巻P596-597) | ○ | ○ | ○ |
| | 1449 | Presyncope Presyncope | R42 | None | 脳の虚血(貧血)による意識の一時的中断の前の病態であるため、新規コードを追加 | △ | ○ | ○ |
| | 1463 | Topagnosis 局所認知 | R20.8 | None | | △ | △ | x |
| | 1478 | Edema of Bauhin's valve えん<嚙>下麻痺 | R13 | G52.1 | えん<嚙>下麻痺はICD-10でR13となっているが、CIM-10ではG52.1となっている。どちらが正しいのか。 | △ | x | x |
| | 1376 | Eclamptic coma 子癇性昏睡 | O15 | R56.8 | 索引の精度向上のためコードの変更 昏睡 R40.2 -子かん<癇>性R56.8→O15.9 子かん, 子かん性(昏睡)O15.9 -男性 R56.8 削除 索引の引き方でR56.8 O15.9 になる 一貫性が必要ではないか | △ | ○ | ○ |

| 日本からの提案 | ID | 提案題名 | 第1に影響を受けるコード | 第2に影響を受けるコード | 提案内容の概要 | 投票 (第1回 6/30) | 投票 (第2回) | WHO最終決定 (勧告、否決、取 下げ、持越し) |
|--------------------------------|------|---|--------------|--------------|--|---------------------|-------------|--------------------------------|
| 第X区章 損傷、中毒及びその他の外因の影響(S00-T98) | | | | | | | | |
| | 1297 | Clarification of classification of postprocedural septicaemia 術後敗血症の分類の明確化 | T81.4 | None | T814、術後の敗血症に曖昧さをなくして明解するために内容例示の除外の前の注書き追加の提案 | △ | ○ | ○ |
| ○ | 1320 | Thallium タリウム | T60.4 | T56 | タリウムをT604から削除してT568に加える提案 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | 1326 | Fracture of tooth 歯の破折 | S02 | None | S02のタイトルに「歯の破折」を加えるべきである | ○ | ○ | 論議継続中 |
| 取り下げ | 1327 | Coding for the intracranial injuries 頭蓋内損傷の分類 | S06 | 総論 (4) | 脳挫傷、脳挫滅、外傷性脳内出血の分類を加えてS06の4桁分類の変更を提案。 | ○ | ○ | 外因TAGへ |
| 取り下げ | 1328 | Detailed coding and classification for asphyxia is required 窒息の細分類が必要 | T71 | None | 窒息の細分化の提案(別紙参照) | ○ | ○ | × |
| 取り下げ | 1331 | carbon monoxide 一酸化中毒 | T58 | None | 内容例示の修正(新規細分作成)858頁及び該当する索引の修正 T58 | ○ | ○ | × |
| ○ | 1332 | Dislocation of tooth 歯の脱落 | S03 | None | 内容例示(781頁)の修正及び索引の該当箇所修正 「S03」のタイトルに「歯の」と記載する。 | ○ | ○ | 論議継続中 |
| | 1377 | Complications of orthopedic device 整形外科的器具の合併症 | T84 | M79.9 | 索引の修正 索引の精度向上のため、コードの削除と変更。フランス版CIM-10の方が正しいと思われる。 合併症 --整形外科 M79.9 削除 --器具、挿入物または移植片T84.9→T85.9 --整形外科インターンT84.9 --機械的T84.3→T84.4 整形外科の機械的合併症 索引と内容例示が不一致 索引...T84.3 内容例示...T84.4 | △ | ○ | ○ |
| | 1379 | Cyclobenzaprine シクロベンザプリン | T43 | T48.1 | シクロベンザプリンは抗うつ剤としてではなく、筋弛緩剤として分類されるべきであり、既存の3桁コードの修正を提案する(第19章T43.0→T48.1,不慮X41→X44,自殺X61→X64,故意か不慮Y11→Y14,治療上Y49.0→Y55.1)。(第3巻P857) | ○ | ○ | ○ |
| | 1389 | Encephalopathy described as due to current injury 現在の損傷によると記述された脳症 | S06.2 | None | 脳症(急性)の索引から「新鮮損傷 S062」の記述を削除する提案 | × | ○ | ○ |
| | 1419 | Superficial injury of the thumb and finger 母指及び手指の表在損傷 | S60.9 | None | 索引の修正(コード修正)(472頁) 損傷 --表在性 --手指 S608 --拇指 S608 --手首 S609 | △ | ○ | ○ |

| 日本からの提案 | ID | 提案題名 | 第1に影響を受けるコード | 第2に影響を受けるコード | 提案内容の概要 | 投票 (第1回 6/30) | 投票 (第2回) | WHO最 終決定 (勧告、否決、取 下げ、持越し) |
|-------------------------|------|---|--------------|--------------------------------|---|---------------------|-------------|------------------------------------|
| | 1451 | Intracranial injury 頭蓋内損傷 | S06 | None | 内容例示(P783) S06. 0、S06. 1、S06. 2、S06. 8、S06. 9について、例示の追加及び変更、除外の追加 索引: 損傷に項を追加(P471) | △ | △ | 論議継続中 |
| | 1452 | Injury of muscles and tendons of shoulder 肩の筋及び腱の損傷 | S46.0 | None | 説明に「筋」を追加 「腱」を複数形にする(s追加) | △ | ○ | ○ |
| | 1461 | Burns 熱傷 | T31 | None | 注:(P843) T20-T29→T20-25, T29に訂正 眼及び内臓は体表にあてはまらない | ○ | ○ | ○ |
| | 1462 | Corrosions 腐食 | T32 | None | 注:(P843) T20-T29→T20-25, T29に訂正 眼及び内臓は体表にあてはまらない | ○ | ○ | ○ |
| | 1465 | Trichlorethylene 三塩化エチレン | T53.2 | None | 第三編 薬物及び化学物質の索引表 トリクロロエチレン(三塩化エチレン)及びその下の項 -蒸気 NEC についてコード変更 (索引P885) | ○ | ○ | ○ |
| | 1240 | Septic shock 敗血症性ショック | R57 | A41.9 O08 T80.1 T81.1 | 内容例示(27, 757)修正、コード変更 「敗血症ショック」のコード変更。 ここにコードする。 今現在 A419にコードしているが、 R57. 2を新設して、 | △ | △ | ○ |
| 第XX章 傷病及び死亡の外因(V01-Y98) | | | | | | | | |
| | 1094 | Fall, collision and derailment (2) 転落、衝突および脱線(2) | V81.6 | V81.5 V82.5 V82.6 | 内容例示のV816の「除外」の記載変更 | △ | — | 外因TAGへ |
| | 1095 | Fall, collision and derailment (1) 転落、衝突および脱線(1) | V81.5 | V81.6 V82.5 V82.6 | 内容例示のV815の「除外」の記載変更 | △ | — | 外因TAGへ |
| | 1096 | Fall, collision and derailment (3) 転落、衝突および脱線(3) | V82.5 | V81.5 V81.6 V82.6 | 内容例示のV825の「除外」の記載変更 | △ | — | 外因TAGへ |
| | 1097 | Fall, collision and derailment (4) 転落、衝突および脱線(4) | V82.6 | V81.5 V81.6 V82.5 | 内容例示のV826の「除外」の記載変更 | △ | — | 外因TAGへ |
| | 1260 | Electrically powered indoor-outdoor conveyance deaths 屋内外兼用電動車の事故死 | V09 | None | | △ | △ | ○ |
| | 1263 | Lithium treatment and bipolar affective disorder リチウム治療と双極性感情障害 | N25.1 | Y49.5 | | △ | △ | ○ |

| 日本からの提案 | ID | 提案題名 | 第1に影響を受けるコード | 第2に影響を受けるコード | 提案内容の概要 | 投票 (第1回 6/30) | 投票 (第2回) | WHO最終決定 (勧告、否決、取 下げ、持越し) |
|---|------|---|--------------|--------------|---|---------------------|-------------|--------------------------------|
| 第 X X I 章 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用(Z00-Z99) | | | | | | | | |
| | 1338 | Unacceptable appearance and (or) parameters of a body, not related to traumatism or diseases 外傷又は疾患に関連しない、受け入れがたい現象及び(又は)身体の特長 | Z55-Z65 | None | | × | × | × |
| | 1363 | Intestinal anastomosis 腸管吻合術 | Z98 | None | 索引の修正 Revise code. (コード変更) 索引 P654 吻合術 一腸 K63.8 ⇒ Z98.0 --合併症を伴うもの NEC K91.8 ---尿路がおかされた場合 N99.8 | △ | ○ | ○ |
| | 1434 | Fitting and adjustment of orthopedic device 整形外科的器具の調整 | Z46 | None | 歯科矯正のコード(Z51.8)を削除 | ○ | ○ | ○ |
| 第 X X II 章 特殊目的用コード(U00-U99) | | | | | | | | |
| | 1251 | Ritual or cultural practice as cause of death 死因となる儀式または文化的な行為 | 2 2 章 | None | | △ | △ | ○ |
| | 1346 | ESBL - Extended Spectrum Betalactamases 広スペクトラムβラクタマーゼ | U80 | None | 新規コードU805(ESBL-産生微生物)追加 抗生物質耐性菌には別に新規カテゴリU83・コードU831(項題と同じ)を追加 | △ | △ | 取り下げ |
| | 1467 | Agents resistant to antibiotics and other antimicrobials 1467 「抗生物質と他の抗菌物質に対して耐性を示す病原体 | U80-U89 | None | U80-U89について U82~U84に新規コードを追加 U89.9に例示を追加(別紙) 感染 - 下記を伴うもの -- 抗菌薬耐性細菌 U89.9の下の項を追加 耐性, 下記に対する - 抗生物質, 細菌の作用によるの下の項を追加。 | △ | △ | 論議継続中 |

| 日本からの提案 | ID | 提案題名 | 第1に影響を受けるコード | 第2に影響を受けるコード | 提案内容の概要 | 投票 (第1回 6/30) | 投票 (第2回) | WHO最終決定 (勧告、否決、取 下げ、持越し) |
|---------|------|---|--------------|--------------|--|---------------------|-------------|--------------------------------|
| その他 | | | | | | | | |
| | 1237 | Dagger and asterisk coding and sequencing 剣と星のコーディング及び連鎖 | OTH | 総論 (3-1) | | △ | △ | ○ |
| | 1291 | Classification of bacteria バクテリアの分類 | OTH | None | 臨床知識の変化を反映する必要から、既存コードに追加、除外などの記載を行い、表リストの充実を図ることを提案する。新しい細菌の分類に対するコメント及び情報を送信願う。 | ○ | ○ | ○ |
| | 1368 | Additional dagger asterisk combinations for arthropathy 関節症に対する剣印、星印の組み合わせの追加 | OTH | None | 索引の修正 索引 P107およびP110 関節炎、関節炎(急性)(慢性)(亜急性) M13. 9 ---下記によるもの ---血友病 NEC D66† M36. 2* ---血液学的傷害 NEC D75. 9† M36. 3* ---hepatitis viral (ウイルス肝炎?) B19. 9† M03. 2* ---白血病(性) NEC(M9800/3) C95. 9† M36. 1* ---真菌症 NEC B49† M01. 6 | △ | △ | ○ |
| | 1427 | Corrections to indexing of neoplasms 新生物の索引の修正 | OTH | None | フランスとカナダのレビューによる変更 | △ | △ | × |
| | 1438 | Cysts のう嚢<胞> | OTH | None | フランス語と英語のコードの不一致 | △ | △ | ○ |
| | 1441 | Paralysis Index discrepancies 麻痺索引の矛盾 | OTH | None | 麻痺 -咽頭 --ジフテリアA36. 0に† G99. 8*を追加 麻痺 -ウェーバーの†をI67. 9→I67. 8に変更 | △ | △ | ○ |
| | 1487 | Syphilitic iritis 梅毒性虹彩炎 | OTH | None | 梅毒性虹彩炎は、ICD-10でA51. 4† H22. 0*となっているが、CIM-10ではA50. 3† H22. 0*となっている。ICD-9-CMとICD-10は同じため、CIM-10を変更すべきか。 | △ | ○ | ○ |
| | 1249 | Gastric haemorrhage an obvious consequence of steroid therapy ステロイド治療の明らかな結果である胃出血 | VOL2-4-1 | None | 総論の変更 出血は抗血液凝固薬の中毒又は過量摂取の直接影響によるものであり、中毒または過量摂取の記載がなくても抗血液凝固薬治療が直接影響を及ぼすとは見做さない。胃出血についても、ステロイド、アスピリン及び非ステロイド性抗炎症薬(NSAID)の明白な結果である。従って、罹患率と死亡データ収集の完全性に影響を与えないルールとガイドラインの変更を提案する。(第1巻(P60)ルール3) | × | △ | ○ |
| | 1248 | Rule A inclusion of I46.1 I46.1を含むルールA | I46.1 | 総論 (4-1) | ルール変更 ルールAの不明確な診断名の中に心臓性突然死(I46. 1)を追加する | △ | △ | ○ |
| 取り下げ | 1327 | Coding for the intracranial injuries 頭蓋内損傷の分類 | S06 | 総論 (4) | 脳挫傷、脳挫滅、外傷性脳内出血の分類を加えてS06の4桁分類の変更を提案。 | ○ | ○ | 外因TAGへ |
| 追加 | 1471 | Birth damage and mental retardation 出産損傷と精神遅滞 | 総論 (4-1) | None | ルール 3の変更 精神遅滞は、P00-P04, P05, P07, P10, P10, P11.0, P11.1, P11.2, P11.9, P15.9, P20, P21, P35, P37, P52, P57, P90, P91における周産期の状態の明らかな影響によるものと考えべきである。 | △ | △ | ○ |
| 追加 | 1489 | External cause of Injury matrix 損傷の外因のマトリックス | 総論 (4-1) | None | WHO-FICレイキャビック会議で議論された損傷の外因のマトリックス図をあらためて、URCの議論の趣意に載せることにした。このマトリックスは国際比較をするのに役立つものと考えられる。 | ○ | ○ | ○ |